herpy

PILGIFTSGRODOR

Little Devil Poison Frog

Oophaga sylvatica

Oophaga sylvatica är en av de största pilgiftsgrodorna i släktet *Oophaga*: en dagaktiv skogsbottengroda på 3-4 cm från regnskogarna i Ecuador och Colombia, känd för sina många färgformer i orange, rött och gult på svart eller brun botten och för sin ihärdiga yngelvård.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates sylvaticus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 60 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**23-26 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**18-24 mån.**
Ägg per läggning	**4-20**
Kläckning	**10-16 dagar**
Larvtid	**75-90 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Vaktar äggen, bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett terrarium på minst 60 × 60 × 60 cm (längd, bredd, höjd) passar för ett par. Hanarna är starkt territoriella, och även honorna håller revir och bildar rangordning när det är många djur.
TEMPERATUR	*Oophaga sylvatica* kommer från ett lågland med nästan konstant värme, så temperaturen ska hållas stabil: 23-26 °C på dagen och 21-23 °C på natten.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten hålls på 70-80 % under dagen och går upp mot 100 % tidigt på morgonen och sent på kvällen, som när dimma och regn driver in över skogen. Vid middagstid kan den sjunka till omkring 70 %.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål med 1-2 cm vatten och en ramp av sten eller mossa räcker för vuxna djur; grodorna är dåliga simmare, och vattnet får högst nå omkring tre fjärdedelar av djurets höjd när det står.
LJUS OCH UVB	Ljuset ska först och främst passa växterna. Lysrör eller LED-ljus på omkring 6.500 K ger naturliga färger och god växttillväxt; välj ljuskällor med hög verkningsgrad och en reflektor.
UTFODRING	Vuxna djur tar de vanliga små foderdjuren: hoppstjärtar, små och stora bananflugor, mikrosyrsor, små vaxmalslarver, stövlöss, ugnsfiskar och fint siktat ängsplankton.
BETEENDE OCH HANTERING	Hanarna är starkt territoriella och kallar från morgon till kväll; lätet är kort och högt, omkring fem ljud i sekunden.
NATURLIG UTBREDNING	Ecuador och Colombia.