herpy

PILGIFTSGRODOR

Vicente's Poison Frog

Oophaga vicentei

Oophaga vicentei är en liten, färgstark och dagaktiv pilgiftgroda på upp till 24 mm, som bara finns i centrala Panama. Färgerna varierar från gult och rött till blått, grått och grönt, ofta med ett svart nätmönster. Arten är hotad i naturen, och det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates vicentei*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**12-24 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**19-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Ägg per läggning	**1-12**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**42-56 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Vaktar äggen, bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Oophaga vicentei*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen ska vara 22-26 °C och natten 19-21 °C. Grodorna tål värme dåligt, så undvik längre perioder över 28 °C. Placera terrariet svalt, se till att det finns ventilation och använd lampor som inte värmer.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 % och aldrig under 70 %. Spruta terrariet grundligt en till två gånger om dagen med vatten utan kalk och klor (regnvatten eller osmosvatten), så att blad och bromelior är våta.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En platt vattenskål med 1-2 cm vatten räcker, för grodorna är dåliga simmare. Håll den ren och byt vattnet varje dag eller varannan dag.
LJUS OCH UVB	UVB är knappast nödvändigt, men lite UVB (Fergusonzon 1) skadar inte och är valfritt. Växtljus i 10-12 timmar per dag håller växterna vid liv, och natten ska vara mörk. Lamporna får inte värma upp terrariet över 26 °C.
UTFODRING	Arten ska ha mycket små foderdjur. Basfodret är små, flygoförmögna bananflugor (*Drosophila melanogaster*) och hoppstjärtar, kompletterade med bladlöss, små termiter och små gråsuggor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Oophaga vicentei* är dagaktiv. Hanen kallar från en plats högt uppe och hittar häckningsplatsen. Honor kan äta andra honors ägg, så ett par är det säkraste. Grodorna bör inte hanteras, eftersom huden är tunn och känslig.
NATURLIG UTBREDNING	Panama.