herpy

PILGIFTSGRODOR

Kokoe Poison Frog

Phyllobates aurotaenia

Phyllobates aurotaenia är en dagaktiv pilgiftsgroda på 3-4 cm från Colombias Stillahavskust, svart med två gröna till gyllene ränder längs ryggen. Vilda djur bär ett dödligt hudgift, men uppfödda djur är ogiftiga. Arten är djärv, kallar högt och är lätt att få att föröka sig.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates aurotaenia*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Kraftig**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**8-10 mån.**
Ägg per läggning	**8-28**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par eller en liten grupp *Phyllobates aurotaenia* ska ha ett regnskogsterrarium på minst 60 × 45 × 45 cm för upp till 4 vuxna djur. Arten är aktiv och använder också höjden, så ge den sittplatser och växter att klättra i.
TEMPERATUR	*Phyllobates aurotaenia* trivs bäst svalt. På dagen ska det vara 21-24 °C, och på natten sänks temperaturen till 18-21 °C. Temperaturen får inte komma över 27 °C, eftersom släktet tål värme dåligt.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål med 1-2 cm vatten och en sten eller en sluttande kant, så att grodorna lätt tar sig upp, räcker.
LJUS OCH UVB	Ljuset är först och främst till för växterna. Lysrör eller LED-ljus på omkring 6.500 K ger naturliga färger och god växttillväxt, och omkring 12 timmars ljus om dagen är vanligt.
UTFODRING	*Phyllobates aurotaenia* äter små leddjur. Ungar tar vinglösa *Drosophila melanogaster*, medan vuxna djur gärna äter större foderdjur som *Drosophila hydei* och alldeles små syrsor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Phyllobates aurotaenia* är dagaktiv och djärv, men skygg som ung.
NATURLIG UTBREDNING	Colombia.