herpy

PILGIFTSGRODOR

Lovely Poison Frog

Phyllobates lugubris

Phyllobates lugubris är en liten, svart pilgiftsgroda på 19-24 mm med två gula, gyllene eller orange ränder längs ryggen. Den lever på skogsbotten i låglandsregnskogen på Centralamerikas karibiska sida, från Nicaragua till Panama. Den ses då och då i handeln, men det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Dendrobatidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**19-24 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-3 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**7-21**
Larvtid	**45-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Phyllobates lugubris*.
TEMPERATUR	Dagstemperaturen ska vara 21-25 °C och natten 18-21 °C, som för *Phyllobates vittatus*. Pilgiftsgrodor är mycket känsliga för värme: över 27 °C bör undvikas, och flera timmar vid omkring 29 °C kan vara dödligt.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 80-100 %, och jorden och lövlagret ska alltid vara fuktiga. Spraya terrariet grundligt 1-2 gånger om dagen med regnvatten, osmosvatten eller avklorerat vatten, eller använd ett regn- eller dimsystem.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	De vuxna grodorna dricker inte, utan tar upp vatten genom huden, och en låg vattenskål med 1-3 cm vatten räcker. *Phyllobates vittatus* uppskattar en liten vattenyta, och i naturen bärs grodynglen till vattendrag.
LJUS OCH UVB	Arten lever på skogsbotten, där ljuset är dämpat, och UVB är inte dokumenterat som nödvändigt. En svag UVB-lampa i Ferguson-zon 1 är valfri; ge då alltid skugga.
UTFODRING	*Phyllobates lugubris* äter i naturen mest myror och kvalster. I terrariet ges små leddjur: vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), hoppstjärtar, små gråsuggor och nykläckta syrsor. Bytet ska vara under 3 mm långt.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är dagaktiv och lever gömd bland löv och växter. Hanarna kallar från gömda platser och försvarar sitt revir mot andra hanar, så flera hanar i samma terrarium kan ge stress.
NATURLIG UTBREDNING	Nicaragua, Costa Rica och Panama.