herpy

PILGIFTSGRODOR

Golden Poison Frog

Phyllobates terribilis

Phyllobates terribilis är den största av pilgiftsgrodorna, 4-5 cm, och i naturen ett av de giftigaste djur man känner till. Den lever bara i en liten bit regnskog vid Colombias Stillahavskust. Uppfödda djur är praktiskt taget ogiftiga, djärva och alltid framme, och arten har blivit en av terraristikens mest hållna pilgiftsgrodor.

Familj: Dendrobatidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-5 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Kraftig**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**16-20 mån.**
Ägg per läggning	**10-30**
Kläckning	**10-25 dagar** vid 22-24 °C
Larvtid	**30-60 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 50 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par av *Phyllobates terribilis* ska ha ett terrarium på minst 60 × 50 × 50 cm. En grupp på 4-6 djur ska ha minst 90 × 50 × 50 cm, och fler djur kräver mer golvyta.

TEMPERATUR

På dagen ska det vara 21-25 °C, gärna ett par grader varmare överst i terrariet, och på natten 18-21 °C, vilket motsvarar rumstemperatur. Temperaturen får inte komma över 27 °C under längre tid.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska vara hög, 70-100 %, men botten får inte bli sumpig. En regnanläggning är det enklaste, till exempel med tre sprayningar om dagen på 20-60 sekunder, beroende på dysorna.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ge en eller flera små vattenskålar med omkring 2 cm vatten, till exempel underfat eller halva paranötsskal, som djuren lätt kommer upp ur.

LJUS OCH UVB

Ljuset är först och främst till för växterna. Lysrör eller LED-lister i omkring 12 timmar om dagen räcker, och dagslängden får gärna variera lite över året.

UTFODRING

Phyllobates terribilis tar större byte än de flesta pilgiftsgrodor. I naturen är myror huvudfödan, men den tar många slags små leddjur.

BETEENDE OCH HANTERING

Phyllobates terribilis är dagaktiv, djärv och nyfiken och är framme största delen av dagen med en kort paus mitt på dagen. Hanarna lockar med en mjuk, fågellik drill, särskilt efter sprayning.

NATURLIG UTBREDNING

Colombia.