herpy

PILGIFTSGRODOR

Golfodulcean Poison Frog

Phyllobates vittatus

Phyllobates vittatus är en svart pilgiftsgroda med två klara orange eller gula ränder längs ryggen och blåmarmorerade ben. Den lever bara i låglandsskogen kring Golfo Dulce i sydvästra Costa Rica. I terrariet är den dagaktiv, gillar att ropa och är flitig på att föröka sig, och hanen bär själv grodynglen till vatten.

Familj: Dendrobatidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**8-10 mån.**
Ägg per läggning	**7-21**
Larvtid	**45-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Upp till fyra djur av *Phyllobates vittatus* ska ha ett terrarium på minst 60 × 45 × 45 cm. En grupp på 5-6 djur ska ha mer plats, till exempel 100 × 60 × 60 cm, vilket också ger plats både att röra sig på marken och att klättra.
TEMPERATUR	På dagen ska *Phyllobates vittatus* ha 21-25 °C och på natten 18-21 °C, vilket de flesta rum klarar.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %. Arten tål ner till 50 % under korta perioder om den har tillgång till vatten, men låg luftfuktighet utan vatten kan snabbt bli dödlig.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ge en låg vattenskål eller en liten vattendel med 1-2 cm vatten och en sten eller en bit bark, så att djuren lätt tar sig upp. Grodorna fuktar sig i vattnet, och hanen kan använda det för att avsätta grodyngel.
LJUS OCH UVB	Ljuset är till för växterna. LED-list eller lysrör på en timer i 10-12 timmar om dagen räcker, och natten ska vara mörk. Ge skugga, och ställ aldrig terrariet i direkt solljus. Något behov av UVB hos arten är inte dokumenterat.
UTFODRING	*Phyllobates vittatus* är ovanlig eftersom vuxna djur tar större byten än de flesta pilgiftsgrodor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Phyllobates vittatus* är dagaktiv, och hanarna har en hög, drillande kallelse. Arten kan hållas i par eller grupper.
NATURLIG UTBREDNING	Costa Rica.