herpy

PILGIFTSGRODOR

## Amazonian Poison Frog

# *Ranitomeya amazonica*

*Ranitomeya amazonica* är en pytteliten, dagaktiv pilgiftsgroda på 16-19 mm från Amazonas omkring Iquitos i Peru och Leticia i Colombia. Den är svart med röda, orange eller gula ränder och blågrå marmorering på benen, förökar sig i bromelior och räknas som en av de lättaste små Ranitomeya att hålla och föröka.

Familj: Dendrobatidae  Tidigare namn: *Dendrobates amazonicus*

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **16-19 mm**<br>nos-kloaklängd |
| Livslängd | **5-10 år** |
| Aktiv | **På dagen** |
| Levnadssätt | **Trädlevande och marklevande** |
| Biotop | **Regnskog** |
| Hudgift i naturen | **Mild** |
| Hudgift i fångenskap | **Inget**<br>Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **40 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H för 3 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **21-26 °C** |
| Temperatur, natt | **18-21 °C** |
| Luftfuktighet | **70-100 %** |
| Vatten | **Vattenskål**<br>djup 1-2 cm |
| UVB | **Valfritt** |
| Föda | **Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)** |
| Hålls | **Parvis eller i grupp** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodynglen bärs till vatten** |
| Äggläggning | **I bladveck (t.ex. bromelior)** |
| Könsmogen | **5-8 mån.** |
| Ägg per läggning | **2-8** |
| Kläckning | **10-14 dagar** |
| Larvtid | **60-80 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Färdigfoder och andra grodyngel** |
| Yngelvård | **Bär grodynglen** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga II** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**
Ett par eller en trio *Ranitomeya amazonica* ska ha ett terrarium på minst 40 × 40 × 40 cm. Ska det vara fler grodor, så räkna med omkring 20 liter extra plats per djur, och välj hellre ett högt än ett lågt terrarium.

**TEMPERATUR**
Håll terrariet på 21-26 °C på dagen och 18-21 °C på natten. Grodorna är mest aktiva och föröker sig bäst i den varma änden, vid 24-26 °C.

**LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING**
Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %, helst 80-100 %. Spraya varje dag, gärna morgon och kväll, så att fukten ligger nära 100 % efter sprayningen och sjunker till omkring 70-75 % mitt på dagen. Använd osmosvatten eller regnvatten.

**VATTEN OCH VATTENKVALITET**
*Ranitomeya amazonica* simmar dåligt, så vattnet ska vara grunt och lätt att ta sig upp ur.

**LJUS OCH UVB**
Grodorna är dagaktiva och lever i skogens skugga. Ljuset är först och främst till för växterna: ge 12-14 timmar LED-växtljus per dag. *Ranitomeya amazonica* har inget känt behov av UVB, så UVB är valfritt.

**UTFODRING**
*Ranitomeya amazonica* är så liten att den bara kan ta små foderdjur. Ungar och vuxna tar vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och stora vuxna kan också ta *D. hydei* och nykläckta syrsor.

**BETEENDE OCH HANTERING**
*Ranitomeya amazonica* är dagaktiv, men ofta skygg, och särskilt unga djur gömmer sig mycket. I ett tätt planterat terrarium med många vissna blad kommer grodorna mer fram.

**NATURLIG UTBREDNING**
Peru och Colombia.