herpy

PILGIFTSGRODOR

Blessed Poison Frog

Ranitomeya benedicta

Ranitomeya benedicta är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 16-20 mm från låglandsskogen i norra Peru. Det klart röda huvudet och den svarta kroppen med blått nätmönster gör den till en av de mest färgstarka i släktet. Fram till 2008 räknades den som en underart av *Ranitomeya fantastica*. I naturen är den sårbar, men uppfödda djur förökar sig villigt i ett väl inrett terrarium.

Familj: Dendrobatidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**16-20 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**2-6**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-114 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par *R. benedicta* kan hållas i ett terrarium på 40 × 40 × 40 cm. Två par ska ha ett liggande terrarium på omkring 75 liter, och större är alltid bättre, eftersom ett stort terrarium håller klimatet mer stabilt.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 21-26 °C på dagen och 18-22 °C på natten. Arten trivs bäst vid omkring 21-24 °C, och temperaturen får inte komma över 27 °C under längre tid.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %. En bra rytm är nästan 100 % morgon och kväll och 70-75 % mitt på dagen, så att terrariet torkar upp lite mellan sprayningarna.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål eller en bromelia med vatten i bladvecken räcker.
LJUS OCH UVB	*R. benedicta* är dagaktiv, och ljuset är först och främst till för växterna. Ge 12-14 timmars ljus per dag med lysrör eller LED på timer, året runt, och mörker på natten. Det motsvarar daglängden i tropikerna.
UTFODRING	Grundfodret är små levande leddjur. Djur i alla åldrar tar flyglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och vuxna kan också ta den större *D. hydei*.
BETEENDE OCH HANTERING	*R. benedicta* är dagaktiv och kan vara lite skygg, särskilt som ung, men i ett tätt planterat terrarium med gömställen syns vuxna djur mycket. Hanen sitter fritt framme och lockar.
NATURLIG UTBREDNING	Peru.