herpy

PILGIFTSGRODOR

Red-headed Poison Frog

Ranitomeya fantastica

Ranitomeya fantastica är en dagaktiv pilgiftsgroda på 20-25 mm från norra Peru och en av de största i släktet. Den är ovanligt variabel, och många former har ett lysande orange, rött eller gult huvud över en svart kropp med ljusa teckningar. Grodorna är blixtsnabba och ofta skygga, äggen är svåra att hitta, och arten lämpar sig bäst för en hållare som redan har erfarenhet av pilgiftsgrodor.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates fantasticus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-25 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**3-8**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par eller en trio *R. fantastica* kan hållas i ett terrarium på 40 × 40 × 40 cm. Större är bättre. Många former är trädlevande och använder höjden.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 21-26 °C på dagen och 18-22 °C på natten. Temperaturen får inte komma över 27 °C under längre tid, och över 29 °C kan vara dödligt. Värme är farligare än kyla.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %. En bra rytm är nästan 100 % morgon och kväll och 70-75 % mitt på dagen, så att terrariet får torka upp lite mellan sprayningarna.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål eller en bromelia med vatten i bladvecken räcker.
LJUS OCH UVB	*R. fantastica* är dagaktiv, och ljuset är först och främst till för växterna. Ge 12-14 timmars ljus per dag och mörker på natten. Det är inte dokumenterat att arten behöver UVB.
UTFODRING	Basfodret är små leddjur. Ungar och vuxna tar vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och stora vuxna kan också ta den större *D. hydei*.
BETEENDE OCH HANTERING	*R. fantastica* är dagaktiv, blixtsnabb och ofta skygg, men många djur blir djärvare när de förökar sig. Man ser mest av dem i ett tätt planterat terrarium med gömställen.
NATURLIG UTBREDNING	Peru.