herpy

PILGIFTSGRODOR

Tahuayo Poison Frog

Ranitomeya flavovittata

Ranitomeya flavovittata är en av de minsta arterna i släktet: bara 15-17 mm från nos till kloak. Den är skarpt gul med svart teckning, bruna ben och ljusblå buk och kommer från regnskogen nära Iquitos i nordöstra Peru. Den är dagaktiv och lite skygg, förökar sig villigt i filmburkar och bromelior och är ett bra val för en hållare med lite erfarenhet.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates flavovittatus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-17 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Könsmogen	**5-8 mån.**
Ägg per läggning	**2-6**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder och obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par *R. flavovittata* ska ha ett terrarium på minst 30 × 30 × 45 cm, men större är alltid bättre. En grupp på 3-4 grodor ska ha minst 45 × 45 × 45 cm, och varje extra groda kräver mer plats.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 21-26 °C på dagen och 18-21 °C på natten. Nattemperaturen är lånad från besläktade arter.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska vara 70-100 %. Arten klarar kortvarigt omkring 50 % om den har tillgång till rent vatten, men det är en nödlösning och kan vara dödligt om det varar. Spraya dagligen, och använd osmosvatten eller regnvatten.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ge grodorna en låg vattenskål eller en liten vattendel, och håll vattnet så lågt att den minsta grodan kan sitta med huvud och överkropp ovanför vattnet: arten simmar dåligt. Vattendjupet bör vara 1-2 cm.

LJUS OCH UVB

Grodorna är dagaktiva och lever i regnskogens skugga. Ljuset är först och främst till för växterna: LED-ljus 12-14 timmar om dagen är lämpligt. Det är inte dokumenterat att arten behöver UVB, och det används normalt inte.

UTFODRING

R. flavovittata är så liten att den bara kan ta små foderdjur. Ungar och de flesta vuxna äter vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och stora vuxna kan också ta *D. hydei* och nykläckta syrsor.

BETEENDE OCH HANTERING

R. flavovittata är dagaktiv, snabb och lite skygg. Grodorna blir djärvare om terrariet är tätt beväxt och har många gömställen, och de vänjer sig vid dig om du tittar på dem genom glaset. Hanarna kallar från öppna platser.

NATURLIG UTBREDNING

Peru.