herpy

PILGIFTSGRODOR

Mimic Poison Frog

Ranitomeya imitator

Ranitomeya imitator är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 16-20 mm från norra Peru. Varje lokal form efterliknar en annan giftig groda i samma område, och arten var den första amfibie där man påvisade äkta monogami: paret tar hand om ungarna tillsammans, och honan matar varje grodyngel med obefruktade ägg.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates imitator; Ranitomeya intermedia*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**16-20 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**5-8 mån.**
Ägg per läggning	**1-8**
Kläckning	**7-16 dagar**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder och obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Vaktar äggen, bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par *R. imitator* ska ha ett terrarium på minst 45 × 45 × 45 cm. Grodorna klättrar gärna, så höjden utnyttjas. Inred med ett dräneringslager, en botten som håller fukten och ett tjockt lager vissna blad.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 21-26 °C på dagen och 18-22 °C på natten. Arten trivs bäst vid omkring 21-24 °C. Temperaturen får inte komma över 27 °C under längre tid, och över 29 °C är farligt: värme är farligare än kyla.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %. Sikta på nästan 100 % morgon och kväll och 70-75 % mitt på dagen, så att terrariet får torka upp lite mellan sprayningarna.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

En låg vattenskål eller en bromelia med vatten i bladvecken räcker. Vattnet får inte vara djupare än att den minsta grodan kan sitta i det med huvud och överkropp ovanför vattnet, för arten simmar dåligt. 1-2 cm är en lämplig nivå.

LJUS OCH UVB

R. imitator är dagaktiv och lever i skuggan under skogens tak. Ljuset är först och främst till för växterna. Ge LED-ljus 12-14 timmar om dagen, till exempel kl. 8-20.

UTFODRING

Grundfodret är små leddjur: flyglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), hoppstjärtar och små gråsuggor. Stora vuxna djur kan också ta den större *D. hydei*.

BETEENDE OCH HANTERING

R. imitator är djärv och dagaktiv och syns ofta fritt framme i terrariet. Hanen ropar från fasta platser, och båda könen försvarar parets revir mot artfränder.

NATURLIG UTBREDNING

Peru.