herpy

PILGIFTSGRODOR

Red-backed Poison Frog

Ranitomeya reticulata

Ranitomeya reticulata är en av de minsta pilgiftsgrodorna: bara 13-17 mm, med kopparröd till orange rygg och blågrå ben med svart nätmönster. Den lever i låglandsskogen i Amazonas i nordöstra Peru och östra Ecuador. I terrariet är den djärv och livlig, men krävande, eftersom äggen är svåra att hitta och ungarna är svåra att få att växa upp.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates reticulatus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-17 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-8**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par *R. reticulata* behöver ett terrarium på minst 30 × 30 × 45 cm, gärna 40 × 40 × 45 cm eller större. Grodorna klättrar gärna, så höjden utnyttjas.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 22-26 °C på dagen och 18-22 °C på natten. Temperaturen får inte komma över 27 °C under längre tid, och över 29 °C kan vara dödligt. Värme är alltid farligare än kyla.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %. En bra rytm är nästan 100 % morgon och kväll och 70-75 % mitt på dagen, så att terrariet torkar upp något mellan sprayningarna.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg vattenskål eller en bromelia med vatten i bladvecken räcker.
LJUS OCH UVB	*R. reticulata* är dagaktiv, och ljuset är först och främst till för växterna. Ge 12-14 timmars ljus om dagen, till exempel LED från kl. 8 till 20, och mörker på natten. Det är inte dokumenterat att arten behöver UVB.
UTFODRING	Grundfödan är små leddjur. Ungdjur och de flesta vuxna tar flyglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och stora vuxna kan också ta den större *D. hydei*.
BETEENDE OCH HANTERING	*R. reticulata* är blixtsnabb och djärv och ses ofta fritt framme, som om den inte har en aning om hur liten den är. Hanarna ropar från fasta platser med ett högt, kort surrande.
NATURLIG UTBREDNING	Peru och Ecuador.