herpy

PILGIFTSGRODOR

Sira Poison Frog

Ranitomeya sirensis

Ranitomeya sirensis är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 15-25 mm från östra Peru, norra Bolivia och västligaste Brasilien. Arten omfattar de former som tidigare såldes som "lamasi" och "biolat", och de flesta av dem hör till de lättaste pilgiftsgrodorna att få att föröka sig. Grodorna trivs i grupper när det finns tillräckligt med utrymme.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Ranitomeya lamasi; Dendrobates lamasi; Dendrobates sirensis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-25 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Könsmogen	**5-8 mån.**
Ägg per läggning	**1-8**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**58-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett par eller en trio *R. sirensis* behöver ett terrarium på minst 45 × 45 × 45 cm. Arten har nytta av lite extra golvyta och tät växtlighet, och den stora högfjällsformen trivs bäst i ett större terrarium.

TEMPERATUR
Håll terrariet på 21-25 °C på dagen och 18-21 °C på natten. Temperaturen får inte komma över 27 °C under längre tid, och över 29 °C är farligt.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Luftfuktigheten ska ligga på 80-100 %. Arten tål bara kortvarigt ner till 50 %, och bara om den har tillgång till vatten; låg fuktighet utan vatten kan snabbt bli dödlig.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
En låg vattenskål eller en bromelia med vatten i bladvecken räcker. Håll vattnet 1-2 cm djupt, så att den minsta grodan kan sitta i det med huvud och överkropp ovanför vattnet.

LJUS OCH UVB
R. sirensis är dagaktiv, och ljuset är först och främst till för växterna. Ge 12-14 timmars ljus om dagen med lysrör eller LED och mörker på natten. Det är inte dokumenterat att arten behöver UVB.

UTFODRING
Grundfodret är små leddjur: vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), hoppstjärtar och små gråsuggor. Vuxna tar också den större *D. hydei* och nykläckta syrsor.

BETEENDE OCH HANTERING
R. sirensis är ofta skygg och gömmer sig gärna, så ett tätt beväxt terrarium med många gömställen ger mest att titta på. Hanen ropar för att locka en hona till en äggläggningsplats.

NATURLIG UTBREDNING
Bolivia, Brasilien och Peru.