herpy

PILGIFTSGRODOR

Summers' Poison Dart Frog

Ranitomeya summersi

Ranitomeya summersi är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 16-21 mm från Huallagadalen i Peru, orange eller kopparfärgad med svart marmorering och en svart mask över ögonen. Arten är hotad i naturen, äggen är svåra att hitta, och grodorna är snabba och skygga, så den passar bäst för en hållare med erfarenhet av pilgiftsgrodor.

Familj: Dendrobatidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**16-21 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**4-9**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Vaktar äggen och bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Starkt hotad (EN)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par eller en liten trio av *R. summersi* kan hållas i ett terrarium på minst 30 × 30 × 45 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 21-26 °C på dagen och 18-21 °C på natten. Temperaturen får inte komma över 27 °C under längre tid, och över 29 °C är livsfarligt. Arten tål värme sämre än kyla.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %. En bra rytm är nära 100 % morgon och kväll och 70-75 % mitt på dagen, så att terrariet kan torka upp lite mellan sprayningarna.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

En låg vattenskål eller en bromelia med vatten i bladvecken räcker.

LJUS OCH UVB

R. summersi är dagaktiv, och ljuset är först och främst till för växterna. Ge 12-14 timmars ljus om dagen och mörker på natten. Det är inte dokumenterat att arten behöver UVB.

UTFODRING

Grundfodret är små levande leddjur. Ungar och unga djur tar vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), och stora vuxna kan också ta den större *D. hydei*.

BETEENDE OCH HANTERING

R. summersi är dagaktiv, snabb och ofta skygg, men kan bli djärvare när den har vant sig vid terrariet. Man ser mest av dem i ett tätt bevuxet terrarium med gömställen. Hanen kallar från en öppen plats med ett mjukt surrande läte.

NATURLIG UTBREDNING

Peru.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilgiftsgrodor/ranitomeya-summersi