herpy

PILGIFTSGRODOR

Red Uakari Poison Frog

Ranitomeya uakarii

Ranitomeya uakarii är en mycket liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 13-16 mm från Amazonasbäckenet. Den är svart med röda till orange ränder, gula flanker och blå ben, och den är sällsynt i hobbyn. Skötseln bygger på erfarenheterna med släktet, och arten passar för en van hållare med tålamod och en stabil tillgång på pyttesmå foderdjur.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates uakarii*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-16 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-6 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Ägg per läggning	**2-7**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-100 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och färdigfoder**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par eller en trio *Ranitomeya uakarii* behöver ett terrarium på minst 45 × 45 × 45 cm. Måttet är lånat från släktet. Använder du ungdjur är det säkraste att börja med minst fyra, så att båda könen är med.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 21-25 °C på dagen och 18-21 °C på natten. Siffrorna är lånade från släktet. Extra värme behövs sällan i ett uppvärmt vardagsrum. Ställ aldrig terrariet i direkt solljus, eftersom överhettning kan vara dödlig.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga på 70-100 %. Spraya dagligen, så att fuktigheten ligger nära 100 % morgon och kväll och på 70-75 % mitt på dagen. Då får terrariet torka upp lite mellan sprayningarna.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

En låg vattenskål eller en bromelia med vatten i bladvecken räcker. Håll vattnet 1-2 cm djupt, så att den lilla grodan kan sitta i det med huvud och överkropp ovanför vattnet; djupet är lånat från släktet.

LJUS OCH UVB

Ranitomeya uakarii är dagaktiv, och ljuset är först och främst till för växterna. Ge 12-14 timmars ljus om dagen med lysrör eller LED och mörker på natten. Det är inte dokumenterat att arten behöver UVB.

UTFODRING

Basfodret är små leddjur: vinglösa bananflugor, hoppstjärtar, små vita gråsuggor och nykläckta syrsor.

BETEENDE OCH HANTERING

Ranitomeya uakarii är dagaktiv. I ett tätt planterat terrarium med många gömställen ser du vanligtvis mer av grodorna än i ett kargt terrarium, men de små grodorna är ofta blyga och gömmer sig när du kommer fram till glaset.

NATURLIG UTBREDNING

Brasilien, Colombia och Peru.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilgiftsgrodor/ranitomeya-uakarii