herpy

PILGIFTSGRODOR

Brazilian Poison Frog

Ranitomeya vanzolinii

Ranitomeya vanzolinii är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 17-19 mm från västra Amazonas. Den lever i träden och föder upp sin avkomma i vatten som samlas i bromelior. Honan matar grodynglen med obefruktade ägg.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates vanzolinii*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**17-19 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-6 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Ägg per läggning	**1-6**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder och obefruktade ägg från honan**
Yngelvård	**Bär grodynglen och matar grodynglen med ägg**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**23-26 °C**
Temperatur, natt	**19-23 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par *Ranitomeya vanzolinii* behöver ett terrarium på minst 40 × 40 × 40 cm, gärna 50 × 50 × 50 cm. Grodan är trädlevande och utnyttjar höjden, så ett högt terrarium med många lodräta ytor är bättre än ett lågt och brett.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen ska ligga på 23-26 °C, och på natten sänks den med 3-4 °C till 19-23 °C. Svängningen över året ska vara liten, 1-2 °C. En värmeplats behövs inte, och arten har ingen vintervila.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 70-100 %. Morgon och kväll bör den ligga nära 100 %, och vid middagstid får den sjunka till 70-75 %. Terrariet sprayas dagligen, helst morgon och kväll, med osmosvatten eller regnvatten.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En vattenskål är inte nödvändig för de vuxna djuren, men är en fördel, och den kan vara låg med 1-2 cm vatten.
LJUS OCH UVB	Ljusbehovet för *Ranitomeya vanzolinii* är måttligt. Grodan behöver tillräckligt med ljus för att se sin föda, och växterna behöver mer. LED-belysning för växter eller ett lysrör, tänt 12-14 timmar om dygnet, är lämpligt.
UTFODRING	*Ranitomeya vanzolinii* lever på små, levande leddjur: bananflugor, hoppstjärtar, små tropiska gråsuggor och nykläckta syrsor. Små djur kräver små foderdjur.
BETEENDE OCH HANTERING	*Ranitomeya vanzolinii* är dagaktiv, men blyg. I ett tätt planterat terrarium med många gömställen visar den sig oftare än i ett glest inrett. Grodan har ett drillande läte, som mest hörs på morgonen och kvällen.
NATURLIG UTBREDNING	Brasilien och Peru.