herpy

PILGIFTSGRODOR

Variable Poison Frog

Ranitomeya variabilis

Ranitomeya variabilis är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på 15-20 mm från Andernas östsluttningar och Amazonas. Den har många lokala former i gult, grönt och blått med svart teckning, förökar sig i bromelior och är känd för att hanen bär grodynglen runt mellan växtens vattensamlingar. En bra första art bland de små pilgiftsgrodorna.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates variabilis*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-20 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**I bladveck (t.ex. bromelior)**
Ägg per läggning	**1-10**
Kläckning	**10-14 dagar**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder och andra grodyngel**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par *R. variabilis* behöver ett terrarium på minst 40 × 40 × 40 cm, och samma mått räcker till en trio. Varje extra groda behöver ca 4 liter mer plats. Grodorna klättrar gärna, så välj hellre ett högt än ett lågt terrarium.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 21-26 °C på dagen och 18-22 °C på natten. Kortvarigt tål arten upp till 27 °C, men temperaturen får aldrig komma över 29 °C. Ägg och grodyngel kan hållas vid konstant 24 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska vara 70-100 %. Sikta på nästan 100 % morgon och kväll och 70-75 % mitt på dagen. Arten kan klara sig kortvarigt vid 50 % om den har rent vatten att sitta i, men det är en nödlösning.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ge grodorna en låg vattenskål eller en liten vattendel, och håll vattnet så lågt att den minsta grodan kan sitta med huvud och överkropp ovanför vattnet; arten simmar dåligt.

LJUS OCH UVB

Grodorna är dagaktiva och lever i skogens skugga. Ljuset är först och främst till för växterna: LED-ljus 12-14 timmar om dagen är lagom. Det är inte dokumenterat att arten behöver UVB, och det används normalt inte.

UTFODRING

R. variabilis är så liten att den bara kan ta små foderdjur: hoppstjärtar, vinglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*) och små gråsuggor. Stora vuxna kan också ta *D. hydei*.

BETEENDE OCH HANTERING

R. variabilis är dagaktiv och fredlig. Hanarna ropar från förhöjda platser, och i naturen har arten ett fritt parningssystem utan fasta par och utan försvarade revir.

NATURLIG UTBREDNING

Peru, Ecuador, Colombia, Brasilien och Franska Guyana.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/pilgiftsgrodor/ranitomeya-variabilis