herpy

PILGIFTSGRODOR

Amazonian Poison Frog

Ranitomeya ventrimaculata

Ranitomeya ventrimaculata är en liten, dagaktiv pilgiftsgroda på under 18 mm från regnskogen i östra Ecuador, nordöstra Peru och sydöstra Colombia. I snäv bemärkelse är den svart med tunna skära ränder och blågrått nätmönster på ben och buk. Namnet har i årtionden täckt andra arter i hobbyn, så det är viktigt att veta vad djuren faktiskt är.

Familj: Dendrobatidae Tidigare namn: *Dendrobates ventrimaculatus; Dendrobates minutus ventrimaculatus; Dendrobates duellmani; Ranitomeya duellmani*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-17 mm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fångenskap	**Inget** Uppfödda djur. Viltfångade djur kan behålla giftet länge
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**21-26 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 1-2 cm
UVB	**Valfritt**
Föda	**Små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodynglen bärs till vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per läggning	**1-4**
Larvtid	**60-80 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Färdigfoder och andra grodyngel**
Yngelvård	**Bär grodynglen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Arten i snäv bemärkelse är nästan okänd i terrarier, och det finns ingen skötselerfarenhet som gäller just den. Siffrorna här är desamma som för de andra små Ranitomeya.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 21-26 °C på dagen och 18-22 °C på natten. Temperaturen får aldrig komma över 29 °C, och små terrarier blir snabbt för varma på sommaren. Extra värme behövs sällan, eftersom ljuset till växterna ofta räcker.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten ska vara 70-100 %: nära 100 % morgon och kväll och 70-75 % mitt på dagen. Små pilgiftsgrodor klarar kortvarigt ett fall till 50 % om de har rent vatten att sitta i, men det är en nödlösning.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Ge grodorna en låg vattenskål eller en liten vattendel med 1-2 cm vatten, så att den minsta grodan kan sitta med huvud och överkropp ovanför vattnet; de små pilgiftsgrodorna simmar dåligt.
LJUS OCH UVB	Grodorna är dagaktiva och lever i skogens skugga. Ljuset är först och främst till för växterna: 12-14 timmar om dagen med LED-ljus är vanligt.
UTFODRING	*Ranitomeya ventrimaculata* är så liten att den bara kan ta små foderdjur: hoppstjärtar, flyglösa bananflugor (*Drosophila melanogaster*), små tropiska gråsuggor och nykläckta syrsor. Stora vuxna kan ta *D. hydei*.
BETEENDE OCH HANTERING	*Ranitomeya ventrimaculata* är dagaktiv och lever mest i lövet på skogsbotten. Hanarna ropar med ett snabbt surrande. Små Ranitomeya är ofta skygga, men i ett tätt bevuxet terrarium ser man typiskt mer av dem.
NATURLIG UTBREDNING	Ecuador, Peru och Colombia.