herpy

SALAMANDRAR

Western Tiger Salamander

Ambystoma mavortium

Ambystoma mavortium är en kraftig, upp till 30-35 cm lång salamander från Nordamerikas prärier, skogar och halvöknar, med gula tvärband och fläckar på mörk botten. Larverna lever i vatten, medan de vuxna tillbringar större delen av livet i självgrävda gångar och kommer fram på natten. Vissa djur omvandlas aldrig och blir könsmogna med gälarna kvar.

Familj: Ambystomatidae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-30 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Halvöken och tempererad skog och äng**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**5-36 mån.**
Ägg per säsong	**100-1 000**
Kläckning	**19-50 dagar**
Larvtid	**75-150 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 25 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**80-95 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Vuxna djur kan hållas i många slags behållare. Den enklaste är en stor plastlåda med tättslutande lock och många små ventilationshål; ett glasterrarium med trådnätslock ger bättre insyn.
TEMPERATUR	Temperaturen ska ligga på 18-22 °C på dagen och gärna något lägre på natten, både för larver och vuxna. Arten tål kyla bättre än värme.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Substratet ska vara fuktigt men aldrig blött eller geggigt, eftersom djuret tar upp vatten genom huden och inte dricker med munnen. Luftfuktigheten är inte uppmätt för arten; ett fuktigt substrat ger omkring 80-95 %.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	En låg, tung vattenskål är inte nödvändig, men den är en bra säkerhet: blir substratet för torrt söker djuret ner i skålen, så den förebygger dödsfall av uttorkning.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och behöver inget särskilt ljus. Det finns ingen kunskap om att den behöver UVB, och kraftigt UV-ljus kan skada ögon och hud hos amfibier.
UTFODRING	Larver och neotena djur äter daggmaskar, komposmaskar, lagom stora syrsor, vaxmalslarver och små fiskar. Små bitar kött kan ges som en enstaka middag, men inte som huvudfoder, eftersom kött saknar vitaminer och mineraler.
BETEENDE OCH HANTERING	Vuxna djur gräver och ligger gömda större delen av dagen. De är nattaktiva och aktiva jägare som väntar i bakhåll. Många djur lär sig känna igen sin skötare och tigger mat.
NATURLIG UTBREDNING	Kanada, USA och Mexiko.