herpy

SALAMANDRAR

Tigersalamander

Ambystoma tigrinum

Ambystoma tigrinum är en kraftig salamander från östra halvan av USA på typiskt 15-20 cm med gula till olivgröna fläckar på brun till svart botten. Larverna lever i vatten, medan de vuxna tillbringar större delen av livet i självgrävda gångar och kommer fram på natten. Vissa djur genomgår aldrig metamorfos och blir könsmogna med gälarna kvar.

Familj: Ambystomatidae Engelska: Eastern Tiger Salamander **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-33 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**12-20 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Tempererad skog och äng**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**5-48 mån.**
Ägg per säsong	**100-1 000**
Kläckning	**12-50 dagar**
Larvtid	**75-150 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 25 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**18-22 °C**
Temperatur, natt	**16-22 °C**
Luftfuktighet	**80-95 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Vuxna djur kan hållas i många slags behållare. Den enklaste är en stor plastlåda med tättslutande lock och många små ventilationshål; ett glasterrarium med nätlock ger bättre insyn.

TEMPERATUR
Ambystoma tigrinum ska ha 18-22 °C på dagen, både som larv och som vuxen, och på natten får temperaturen gärna sjunka till 16 °C. Arten tål kyla bättre än värme.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Substratet ska vara fuktigt, men aldrig blött eller geggigt, eftersom djuret tar upp vatten genom huden. Luftfuktigheten är inte dokumenterad för arten; 80-95 % är lånat från *Ambystoma mavortium*.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Vuxna djur ska inte ha någon vattendel: de är dåliga simmare och kan drunkna. En låg, tung vattenskål är inte nödvändig, men den är en bra säkerhet, för blir substratet för torrt söker djuret sig ner i skålen.

LJUS OCH UVB
Ambystoma tigrinum är nattaktiv och behöver inget särskilt ljus. Det finns ingen kunskap om att arten behöver UVB, och kraftigt UV-ljus kan skada ögon och hud hos groddjur.

UTFODRING
Larver och neotena djur äter daggmaskar, kompostmaskar, lagom stora syrsor, vaxmottslarver och små fiskar (inte guldfisk). Kött kan ges som en enstaka måltid, men inte som huvudfoder, eftersom kött saknar vitaminer och mineraler.

BETEENDE OCH HANTERING
Vuxna djur gräver och ligger gömda större delen av dagen. De är nattaktiva och jagar från bakhåll. Många djur lär sig känna igen sin hållare och tigger mat. Arten är en ensamvarg utanför yngeltiden och trivs bra ensam.

NATURLIG UTBREDNING
USA.