herpy

SALAMANDRAR

Mindre vattensalamander

Lissotriton vulgaris

Lissotriton vulgaris är en liten, anpassningsbar vattensalamander på 8-11 cm som lever större delen av året på land och bara går i vattnet för att föröka sig. Hanen får på våren en vågig ryggkam och starka färger. Arten är härdig i ett svalt akvaterrarium med vintervila, och den lägger gärna ägg, så att hela livscykeln kan följas.

Familj: Salamandridae Engelska: Smooth Newt Tidigare namn: *Triturus vulgaris* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**8-11 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**0,3-5,2 g**
Livslängd	**4-14 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark och tempererad skog och äng**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**12-20 °C**
Temperatur, natt	**8-15 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 10-20 cm
Vattentemperatur	**10-20 °C**
UVB	**Behövs inte**
Vintervila	**5-10 °C** 8-12 veckor
Föda	**Insekter, små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor) och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**24-36 mån.**
Ägg per säsong	**100-500**
Kläckning	**8-35 dagar**
Larvtid	**42-120 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Vuxna djur behöver både en vatten- och en landdel. Ett akvaterrarium på 60 × 30 × 30 cm passar för upp till 4 vuxna djur, och större är bättre: mer vattenyta ger djuren plats under parningstiden.

TEMPERATUR
Lissotriton vulgaris är kylälskande. Dagstemperaturen är 12-20 °C och nattemperaturen 8-15 °C. Omkring 20 °C är det högsta djuren bör ha under längre tid, och de är aktiva ända ner till omkring 5 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING
Den mjuka huden torkar snabbt, så landdelen ska hållas fuktig, med en luftfuktighet på 80-100 %.

VATTEN OCH VATTENKVALITET
Vattendelen ska vara 10-20 cm djup och 10-20 °C. Använd avkloratat kranvatten, kranvatten som har fått stå några dagar, eller regnvatten; arten är inte kräsen med pH, men klor är skadligt.

LJUS OCH UVB
UVB är inte nödvändigt för arten, som lever dolt och är aktiv i skymningen och på natten. Djuren undviker sol.

UTFODRING
Lissotriton vulgaris äter alla små djur den kan svälja. På land får vuxna djur små daggmaskar, små nakensnäckor, gråsuggor, vita maskar, bladlöss, bananflugor och små syrsor.

BETEENDE OCH HANTERING
Arten är fredlig och kan hållas i par eller i grupper med fler honor än hanar. Under parningstiden förföljer hanarna honorna, så fler honor än hanar, många växter och bra gömslen ger ro.

NATURLIG UTBREDNING
Irland, Storbritannien, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Schweiz, Italien, Slovenien, Kroatien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland och Kazakstan.