herpy

SALAMANDRAR

Guizhou Warty Newt

Paramesotriton caudopunctatus

Paramesotriton caudopunctatus är en kraftig, nästan helt vattenlevande salamander på upp till 16 cm från bergsskogarna i södra centrala Kina. Artnamnet syftar på de små fläckarna på svansen. Arten växer ovanligt långsamt, är sällsynt i fångenskap och behöver svalt, rent vatten.

Familj: Salamandridae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-16 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskog, bergsskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**108-120 mån.**
Ägg per säsong	**20-115**
Läggningar per år	**1**
Kläckning	**21-56 dagar** vid 18-25 °C
Larvtid	**80-110 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**16-22 °C**
Temperatur, natt	**14-18 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 15-20 cm
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Paramesotriton caudopunctatus*, och arten är sällsynt i fångenskap.
TEMPERATUR	*Paramesotriton caudopunctatus* ska hållas svalt: 16-22 °C på dagen och 14-18 °C på natten, och vattnet får inte bli varmare än 22 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	*Paramesotriton caudopunctatus* är nästan helt vattenlevande, så luftfuktigheten spelar liten roll; 70-90 % är bra. En landdel ska vara fuktig så länge djuren använder den.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet ska vara 15-20 cm djupt. Använd avklorerat kranvatten eller källvatten. Vattnet ska vara rent, och extrema värden av pH och hårdhet undviks. Ett svampfilter eller ett litet invändigt filter med svag ström passar.
LJUS OCH UVB	*Paramesotriton caudopunctatus* behöver inte kraftigt ljus. Ett enkelt lysrör eller LED-rör på timer ger en fast dygnsrytm på omkring 12 timmar. UVB är inte nödvändigt.
UTFODRING	*Paramesotriton caudopunctatus* äter samma som resten av släktet: hackade daggmaskar, syrsor, nyskalade mjölmaskar, kackerlackor och bitar av räkor. Vuxna utfodras två gånger i veckan, unga 3-4 gånger i veckan.
BETEENDE OCH HANTERING	*Paramesotriton caudopunctatus* är mer aktiv än de flesta arter i släktet. Unga landdjur är däremot mycket gömda och syns sällan.
NATURLIG UTBREDNING	Kina.