herpy

SALAMANDRAR

Rough-skinned Newt

Taricha granulosa

Taricha granulosa är en 13-22 cm lång vattensalamander från Nordamerikas Stillahavskust, med mörk, grynig rygg och skarpt orange buk. Huden innehåller tetrodotoxin, ett av de kraftigaste gifterna hos groddjur, och djuret är dödligt giftigt om det sväljs. Arten växlar mellan vatten och land, kan hållas i vatten hela året och ska hållas svalt.

Familj: Salamandridae Tidigare namn: *Salamandra granulosa; Triturus granulosus; Triturus similans* **Kraftig hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-22 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**12-18 år**
Aktiv	**På dagen och på natten**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Våtmark och tempererad skog och äng**
Hudgift	**Kraftig** Undvik hudkontakt och tvätta händerna noga efter arbete i terrariet
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**48-60 mån.**
Ägg per säsong	**7-30**
Kläckning	**21-42 dagar**
Larvtid	**60-150 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-21 °C**
Temperatur, natt	**14-18 °C**
Luftfuktighet	**80-95 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 20-30 cm
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter, färdigfoder och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Taricha granulosa är den mest vattenlevande arten i släktet. Djuren växlar mellan land och vatten, vissa i månader eller år i taget, men från omkring ett års ålder kan de hållas i vatten hela året.

TEMPERATUR

Taricha granulosa älskar svalka. På sommaren hålls vatten och luft på 18-21 °C. Blir det varmare, upp mot 24 °C, söker djuren sig upp på land; längre perioder över 21 °C bör undvikas.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Landdelen och gömställena ovanför vattnet ska vara fuktiga, men inte dyblöta. Luftfuktigheten är inte mätt för arten; ett akvaterrarium med lock och fuktiga gömställen ger omkring 80-95 %. God ventilation förebygger hudinfektioner.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Vattnet ska vara 20-30 cm djupt, och djupare vatten skadar inte: det är nästan omöjligt att ge arten för djupt vatten i ett vanligt akvarium.

LJUS OCH UVB

Arten behöver inte UVB. Vanligt dagsljus i rummet eller ett svagt lysrör på dagen och mörker på natten räcker. Akvariet får inte stå i direkt sol, och värmelampor ska undvikas.

UTFODRING

Taricha granulosa är ett opportunistiskt rovdjur. I naturen äter den tånglöss, insekter, sniglar, iglar, grodyngel och groddjurs- och fiskägg.

BETEENDE OCH HANTERING

Aktiviteten varierar: vissa djur är framme på dagen, andra gömmer sig under rötter och stenar och jagar på natten. Under yngeltiden håller hanen fast om honan i parningsgreppet, som kan vara från timmar till flera dagar.

NATURLIG UTBREDNING

USA och Kanada.