herpy

SALAMANDRAR

Black Knobby Newt

Tylototriton asperrimus

Tylototriton asperrimus är en mörk, vårtig krokodilsalamander på 12-15 cm med knöliga revbensknölar och kraftiga ryggkammar. Arten lever i fuktiga bergstrakter i den kinesiska provinsen Guangxi och har gett namn åt en hel grupp nära besläktade krokodilsalamandrar, som först nyligen har skilts ut som egna arter.

Familj: Salamandridae Tidigare namn: *Echinotriton asperrimus; Pleurodeles asperrimus* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**12-15 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Bergsskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattendel** djup 1-5 cm
UVB	**Valfritt**
Vintervila	**8-12 °C** 8-12 veckor
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per säsong	**30-80**
Kläckning	**20-36 dagar** vid 22-24 °C
Larvtid	**50-110 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Tylototriton asperrimus*.
TEMPERATUR	På sommaren hålls terrariet på 20-24 °C på dagen och 18-21 °C på natten, vilket motsvarar sommaren i utbredningsområdet.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten är 80-100 %. Terrariet sprutas dagligen med en blomspruta, och det ska finnas både fuktigare och torrare zoner, så att luften inte står stilla.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattendelen ska ha mjukt, svagt surt vatten. Regnvatten eller osmosvatten passar. Vattnets pH är inte dokumenterat för *Tylototriton asperrimus*. *Tylototriton ziegleri* hålls vid pH 6,4-6,8.
LJUS OCH UVB	Ljuset har ingen särskild betydelse för djuren och anpassas efter växterna: LED-list eller lysrör i 12 timmar på sommaren och 10-11 timmar på vintern. UVB behövs inte för den gömda arten.
UTFODRING	Vuxna djur får bladmaskar, syrsor, husyrsor, vaxmottslarver, daggmaskar och gråsuggor i lämplig storlek ungefär två gånger i veckan. På vintern äter de oregelbundet och mycket mindre.
BETEENDE OCH HANTERING	Hos de nära besläktade arterna lever djuren mycket gömda och ses mest när de matas eller när hanarna är i vattnet. Par eller små grupper kan hållas tillsammans i ett rymligt terrarium med många gömslen.
NATURLIG UTBREDNING	Kina.