herpy

SALAMANDRAR

Himalayan Crocodile Newt

Tylototriton verrucosus

Tylototriton verrucosus är en stor, mörkbrun krokodilsalamander från bergen i västra Yunnan, norra Myanmar och angränsande trakter. Den blir 13-24 cm och är den mest vattenälskande av de krokodilsalamandrar som hålls i terrarier: under den varma delen av året stannar den ofta helt i vattnet, där den är aktiv och nyfiken.

Familj: Salamandridae Tidigare namn: *Pleurodeles verrucosus; Triturus verrucosus* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-24 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**12-18 g**
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Semiakvatisk**
Biotop	**Bergsskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**12-36 mån.**
Ägg per säsong	**30-200**
Kläckning	**10-12 dagar** vid 25 °C
Larvtid	**90-150 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 35 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-25 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 12-15 cm
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	*Tylototriton verrucosus* hålls bäst i ett akvaterrarium. Över omkring 18 °C kan den mörka formen hållas helt i vatten.
TEMPERATUR	På dagen ska temperaturen vara 18-25 °C, omkring 25 °C på sommaren, och på natten 15-20 °C. På vintern hålls djuren vid 15-18 °C. Den mörka formen tål i några dagar både högre och lägre temperaturer utan skada.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten är inte avgörande i en vattenrik uppställning; 70-90 % är en uppskattning. Där det finns land hålls landdelen fuktig, men inte geggig. Se till att luften inte står stilla.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattendjupet är 12-15 cm. Byt 20-30 % av vattnet varannan vecka, och oftare om det finns många matrester. Kranvatten behandlas med vattenberedare mot klor, kloramin och tungmetaller innan det används.
LJUS OCH UVB	Arten är skymnings- och nattaktiv, och UVB behövs inte. En dagslängd på omkring 12 timmar på sommaren är en bra, men inte nödvändig rytm, och ljuset ska i övrigt bara passa växterna. Undvik direkt sol.
UTFODRING	Arten är inte kräsen, och stora honor kan äta förbluffande mycket på kort tid.
BETEENDE OCH HANTERING	I vattnet är djuret aktivt och nyfiket och kan bli ganska tamt: det simmar fram till rutan för att få mat och tar foder från pincett och fingrar. Det lämpar sig dock inte för daglig hantering.
NATURLIG UTBREDNING	Kina, Myanmar (Burma), Indien och Thailand.