herpy

SALAMANDRAR

Vietnam Crocodile Newt

Tylototriton vietnamensis

Tylototriton vietnamensis är en liten, mörk krokodilsalamander på 12-17 cm från några få skogsrester i norra Vietnam. Djuret är svart till brungrått, med klart gula till orangeröda fingrar, tår och svansbas, och lever mest på land. Arten beskrevs först 2005 och är sårbar i naturen.

Familj: Salamandridae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**12-17 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**7-18 g**
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**På marken**
Könsmogen	**18 mån.**
Ägg per säsong	**5-178**
Läggningar per år	**1-2**
Kläckning	**28 dagar** vid 22-24 °C
Larvtid	**60-180 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**23-25 °C**
Temperatur, natt	**23-25 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattendel** djup 1-5 cm
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	*Tylototriton vietnamensis* hålls i ett regnskogsterrarium med en vattendel.
TEMPERATUR	Från mars till oktober hålls terrariet vid 23-25 °C dygnet runt; en särskild nattemperatur är inte dokumenterad. Korta toppar över 30 °C tål, men det ska alltid finnas svalare ställen i terrariet.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten är 70-100 % under den varma delen av året. Terrariet sprayas dagligen med en blomspruta eller ett regnsystem; mängden beror på terrariets storlek och ventilation.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattendelen är 1-5 cm djup och fyller en fjärdedel av bottenytan. Vattnet är mjukt och svagt surt (pH 6,4-6,8) som i naturen. Ge alltid en lätt utgång med stenar, grus eller en flat strand.
LJUS OCH UVB	Ljuset har ingen särskild betydelse för djuren, och de gillar inte kraftigt ljus. Belysningen kan anpassas efter växterna, med LED-list eller lysrör, eller bara det ljus som faller in i rummet. UVB behövs inte.
UTFODRING	Vuxna djur får daggmaskar, syrsor och vaxmalslarver, och foderdjuren matas själva med en varierad kost och pudras med vitamin- och mineraltillskott.
BETEENDE OCH HANTERING	Djuren söker skydd och gillar inte skarpt ljus. Hanarna går ner i vattnet under fortplantningstiden, blir ljusare och får en tydligt annorlunda hud, och de väntar på honorna. Resten av året lever båda könen på land.
NATURLIG UTBREDNING	Vietnam.