herpy

SALAMANDRAR

Wenxian Knobby Newt

Tylototriton wenxianensis

Tylototriton wenxianensis är en medelstor, nästan helt svart krokodilsalamander med orangea tåspetsar och svanskant. Den lever gömd i skog och buskage i bergen i centrala Kina och går bara i vattnet för att fortplanta sig; äggen läggs på land. Det finns bara lite kunskap om skötseln, så anvisningarna bygger på nära släktingar.

Familj: Salamandridae **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-16 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och semiakvatisk**
Biotop	**Bergsskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per säsong	**30-80**
Kläckning	**20-36 dagar** vid 22-24 °C
Larvtid	**80-130 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattendel** djup 3-5 cm
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Tylototriton wenxianensis*.
TEMPERATUR	På sommaren hålls terrariet på 22-24 °C på dagen, på vintern vid omkring 18 °C, och på natten får det sjunka till 15-20 °C. Kortvarigt lägre temperaturer skadar inte.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	På sommaren sprayas terrariet dagligen, så att mossa och bottensubstrat hålls fuktiga och luftfuktigheten ligger på 70-90 %.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet är mjukt och lätt surt, pH 6,4-6,8, och högst omkring 5 cm djupt.
LJUS OCH UVB	UVB behövs inte. Arten lever gömd och gillar inte starkt ljus; ljuset är främst till för växterna. Ge omkring 12 timmars ljus på sommaren och 10-11 timmar på vintern. Undvik direkt sol, som värmer upp terrariet och vattnet.
UTFODRING	Födan är inte dokumenterad för arten. Släktet tar vanlig salamanderföda: daggmaskar, syrsor, gråsuggor och vaxmalslarver. Vuxna djur matas ungefär två gånger i veckan, och på vintern äter de oregelbundet och mycket mindre.
BETEENDE OCH HANTERING	Djuren lever mycket gömda och kan hållas ensamma, i par eller i små grupper. Håll arten för sig själv utan andra groddjur. Ta bara upp djuren när det är nödvändigt, med rena, våta händer eller pudderfria handskar.
NATURLIG UTBREDNING	Kina.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/salamandrar/tylototriton-wenxianensis