herpy

SALAMANDRAR

Ziegler's Crocodile Newt

Tylototriton ziegleri

Tylototriton ziegleri är en liten, nästan helt svart krokodilsalamander på 13-16 cm med tre rader av stora vårtor längs ryggen och klart röda fingrar, tår och svansundersida. Arten beskrevs 2013, lever gömd i bergsskogar i norra Vietnam och södra Kina och är lätt att hålla i ett terrarium med en liten vattendel.

Familj: Salamandridae Tidigare namn: *Yaotriton ziegleri* **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-16 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**6-16 g**
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per säsong	**30-80**
Kläckning	**20-36 dagar** vid 20-24 °C
Larvtid	**50-110 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-24 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**80-100 %**
Vatten	**Vattendel** djup 1-5 cm
UVB	**Valfritt**
Vintervila	**16-18 °C** 12-17 veckor
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	*Tylototriton ziegleri* hålls i ett regnskogsterrarium med en liten vattendel. Tre vuxna djur behöver ett terrarium på minst 60 × 40 × 40 cm.
TEMPERATUR	Från mars till oktober hålls terrariet på 22-24 °C på dagen och 20-22 °C på natten. Högre temperaturer tål djuren en kort tid, men längre perioder över cirka 25 °C bör undvikas, och det ska finnas svala platser i terrariet.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	Luftfuktigheten är 80-100 %. Terrariet sprayas dagligen med en blomspruta eller ett regnsystem, och mängden anpassas efter terrariets storlek och ventilation, så att botten inte blir stillastående blöt.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattendelen ska ha mjukt, svagt surt vatten med pH 6,4-6,8; till exempel regnvatten som har fått stå en tid. Vattnet är högst 5 cm djupt. Använd aldrig kranvatten utan att ta bort klor.
LJUS OCH UVB	Ljuset har ingen särskild betydelse för djuren, som inte gillar kraftigt ljus. Det anpassas efter växterna: LED-band eller lysrör i 12 timmar på sommaren och 10-11 timmar på vintern. Indirekt rumsljus räcker också.
UTFODRING	Vuxna djur får foder som är vanligt för salamandrar: kompostmaskar, syrsor, hussyrsor, vaxmalslarver, daggmaskar och gråsuggor i lämplig storlek.
BETEENDE OCH HANTERING	Djuren är gömda och stilla och syns mest när de matas, eller när hanarna är i vattnet. Aggressionen mellan vuxna är normalt inget problem, och par eller små grupper kan hållas tillsammans om terrariet är tillräckligt stort.
NATURLIG UTBREDNING	Vietnam och Kina.