herpy

SALAMANDRAR

# *Ambystoma mavortium*

*Ambystoma mavortium* är en kraftig, upp till 30-35 cm lång salamander från Nordamerikas prärier, skogar och halvöknar, med gula tvärband och fläckar på mörk botten. Larverna lever i vatten, medan de vuxna tillbringar större delen av livet i självgrävda gångar och kommer fram på natten. Vissa djur omvandlas aldrig och blir könsmogna med gälarna kvar.

Familj: Ambystomatidae  Engelska: Western Tiger Salamander  Publicerad 16 november 2026  **Mild hudgift**

## FAKTARUTA

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **15-30 cm**<br>total längd inkl. svans |
| Livslängd | **10-20 år** |
| Aktiv | **På natten** |
| Levnadssätt | **Marklevande och grävande** |
| Biotop | **Halvöken och tempererad skog och äng** |
| Hudgift | **Mild**<br>Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun |
| Svårighetsgrad | **Nybörjare** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Larver i vatten** |
| Äggläggning | **I vatten** |
| Könsmogen | **5-36 mån.** |
| Ägg per säsong | **100-1 000** |
| Kläckning | **19-50 dagar** |
| Larvtid | **75-150 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)** |
| Yngelvård | **Ingen** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **50 × 25 × 30 cm**<br>L × B × H för 1 vuxet djur |
| Temperatur, dag | **18-22 °C** |
| Temperatur, natt | **16-20 °C** |
| Luftfuktighet | **80-95 %** |
| Vatten | **Vattenskål** |
| UVB | **Behövs inte** |
| Föda | **Insekter, ryggradsdjur och maskar/sniglar** |
| Hålls | **Ensamma eller parvis** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ej listad** |
| EU-bilaga | **Ej listad** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Vuxna djur kan hållas i många slags behållare. Den enklaste är en stor plastlåda med tättslutande lock och många små ventilationshål; ett akvarium med trådnätslock ger bättre insyn. |
| **TEMPERATUR** | Temperaturen ska ligga på 18-22 °C på dagen och gärna något lägre på natten, både för larver och vuxna. Arten tål kyla bättre än värme. |
| **LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING** | Substratet ska vara fuktigt men aldrig blött eller geggigt, eftersom djuret tar upp vatten genom huden och inte dricker med munnen. Luftfuktigheten är inte uppmätt för arten; ett fuktigt substrat ger omkring 80-95 %. |
| **VATTEN OCH VATTENKVALITET** | En låg, tung vattenskål är inte nödvändig, men den är en bra säkerhet: blir substratet för torrt söker djuret ner i skålen, så den förebygger dödsfall av uttorkning. |
| **LJUS OCH UVB** | Arten är nattaktiv och behöver inget särskilt ljus. Det finns ingen kunskap om att den behöver UVB, och kraftigt UV-ljus kan skada ögon och hud hos amfibier. |
| **UTFODRING** | Larver och neotena djur äter daggmaskar, komposmaskar, lagom stora syrsor, vaxmalslarver och små fiskar. Små bitar kött kan ges som en enstaka middag, men inte som huvudfoder, eftersom kött saknar vitaminer och mineraler. |
| **BETEENDE OCH HANTERING** | Vuxna djur gräver och ligger gömda större delen av dagen. De är nattaktiva och aktiva jägare som väntar i bakhåll. Många djur lär sig känna igen sin skötare och tigger mat. |
| **NATURLIG UTBREDNING** | Kanada, USA och Mexiko. |