herpy

SALAMANDRAR

Tylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis är en kraftig, svartbrun krokodilsalamander på 15-21 cm med tre breda orangea till rödaktiga ränder längs kroppen. Den lever på land i bergen i Guizhou och Yunnan och går mest i vattnet för att fortplanta sig. Den sköts bäst i ett stort terrarium med både land och vatten.

Familj: Salamandridae Engelska: Guizhou Crocodile Newt Tidigare namn: *Pleurodeles kweichowensis* Publicerad 16 november 2026

Mild hudgift

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-21 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och semiakvatisk**
Biotop	**Bergsskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Ägg per säsong	**50-150**
Läggningar per år	**1**
Kläckning	**10-12 dagar** vid 25 °C
Larvtid	**80-100 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-25 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 10-15 cm
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Tylototriton kweichowensis behöver ett stort terrarium, eftersom djuren är stora och tunga, behöver en stabil landyta med ett gömställe för varje djur och ska ha tillräckligt med vatten för både yngel och ett filter.

TEMPERATUR

Arten trivs vid vanlig rumstemperatur: 23-26 °C på sommaren och 15-20 °C på vintern. Terrariets dagstemperatur är 18-25 °C och nattemperaturen 15-20 °C. Varmare än omkring 26 °C bör det inte bli under längre tid.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska vara hög, men botten inte blöt; 70-90 % är en uppskattning. Landdelen hålls fuktig utan att bli geggig, och en del av botten får gärna vara torrare.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Vattendelen fyller ungefär hälften av terrariet. Djupet är inte dokumenterat för arten; 10-15 cm är lånat från *Tylototriton verrucosus*. Använd avklorerat kranvatten och ett stilla filter som inte ger stark ström.

LJUS OCH UVB

UVB behövs inte, och arten är mest aktiv i skymningen och på natten.

UTFODRING

Vuxna djur får hackade daggmaskar, syrsor och andra bytesdjur av lämplig storlek. Vaxmalslarver och andra feta larver är omtyckta, men ska inte vara basfoder. Med en varierad kost behövs normalt inga vitamin- och mineraltillskott.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är långsam och klumpig. 2-3 djur kan hållas tillsammans när det finns tillräckligt med gömslen för varje djur.

NATURLIG UTBREDNING

Kina.