herpy

SALAMANDRAR

Tylototriton shanjing

Tylototriton shanjing är en kraftig, mörkbrun krokodilsalamander från Yunnan i sydvästra Kina med lysande orange huvud, ryggkam, körtelvårtor och svans. Den blir 12-20 cm, lever nästan hela året på land och går bara i vattnet för att fortplanta sig. Djuret är lugnt och härdigt, men huden avsöndrar ett giftigt sekret, så händerna ska tvättas efter all kontakt.

Familj: Salamandridae Engelska: Emperor Crocodile Newt Publicerad 16 november 2026 **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**12-20 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och semiakvatisk**
Biotop	**Bergsskog**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**75 × 30 × 30 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-25 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**24 mån.**
Ägg per säsong	**30-150**
Kläckning	**10-12 dagar** vid 22-25 °C
Larvtid	**90-150 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Tylototriton shanjing är en landsalamander som bara behöver vatten under fortplantningstiden. Fyra vuxna djur kan hållas i ett terrarium på 75 × 30 × 30 cm; golvyta är viktigare än höjd, och ett par ska ha minst 60 × 30 cm.

TEMPERATUR

Dagstemperaturen är 18-25 °C och nattemperaturen 15-20 °C. På vintern hålls djuren svalare, omkring 15-17 °C, och på en torrare botten; på sommaren får det gärna bli 24-26 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Arten föredrar förhållandevis torra förhållanden, torrare än andra landlevande krokodilsalamandrar. 60-80 % luftfuktighet är en uppskattning.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Utanför fortplantningstiden är vattnet en låg skål med sluttande sidor och avklorerat kranvatten, som byts regelbundet. Under fortplantningstiden ska det finnas en större vattenyta på minst 30 × 30 cm (se "Parring").

LJUS OCH UVB

Tylototriton shanjing är skymnings- och nattaktiv och lever gömd, så den kommer sällan fram medan ljuset är tänt. UVB behövs inte. Ljuset är till för växterna; en LED-lampa som nästan inte värmer räcker.

UTFODRING

Daggmaskar är det bästa basfodret; stora daggmaskar skärs i lagom bitar. Små syrsor är ett bra komplement när de själva är väl utfodrade, och vaxmalslarver och mjölmaskar kan ges som omväxling, men inte som huvudföda.

BETEENDE OCH HANTERING

Djuret är lugnt och långsamt och kan bli mycket tamt: många tigger föda vid rutan när de har vant sig vid sin skötare. Det är ändå inget djur för daglig hantering.

NATURLIG UTBREDNING

Kina.