herpy

SALAMANDRAR

Tylototriton wenxianensis

Tylototriton wenxianensis är en medelstor, nästan helt svart krokodilsalamander med orangea tåspetsar och svanskant. Den lever gömd i skog och buskage i bergen i centrala Kina och går bara i vattnet för att fortplanta sig; äggen läggs på land. Det finns bara lite kunskap om skötseln, så anvisningarna bygger på nära släktingar.

Familj: Salamandridae Engelska: Wenxian Knobby Newt Publicerad 16 november 2026 **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**13-16 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och semiakvatisk**
Biotop	**Bergsskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Erfaren**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Larver i vatten**
Äggläggning	**På marken**
Ägg per säsong	**30-80**
Kläckning	**20-36 dagar** vid 22-24 °C
Larvtid	**80-130 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Andra larver och små vattendjur (dafnier, myggolarver)**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 3 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattendel** djup 3-5 cm
UVB	**Behövs inte**
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Tylototriton wenxianensis*.
TEMPERATUR	På sommaren hålls terrariet på 22-24 °C, på vintern omkring 18 °C, och kortvarigt lägre temperaturer skadar inte; så hålls *T. ziegleri*.
LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING	På sommaren sprayas terrariet dagligen, så att mossa och botten hålls fuktiga; 70-90 % luftfuktighet är en uppskattning.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet är mjukt och lätt surt, pH 6,4-6,8, och högst omkring 5 cm djupt.
LJUS OCH UVB	UVB behövs inte. Arten lever gömd och gillar inte starkt ljus; ljuset är främst till för växterna. Ge omkring 12 timmars ljus på sommaren och 10-11 timmar på vintern. Undvik direkt sol, som värmer upp terrariet och vattnet.
UTFODRING	Födan är inte dokumenterad för arten. Släktet tar vanlig salamanderföda: daggmaskar, syrsor, gråsuggor och vaxmalslarver. Vuxna djur matas ungefär två gånger i veckan, och på vintern äter de oregelbundet och mycket mindre.
BETEENDE OCH HANTERING	Beteendet i fångenskap är inte dokumenterat för arten. Hos *T. ziegleri* lever djuren mycket gömda, och de kan hållas ensamma, i par eller i små grupper. Håll arten för sig själv utan andra groddjur.
NATURLIG UTBREDNING	Kina.