herpy

SKÖLDPADDOR

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis denticulatus är en stor, mörk skogssköldpadda från Amazonas och de angränsande skogarna med gula till orange fjäll på huvud och ben. Skölden är vanligtvis 35-45 cm lång, och i vissa bestånd blir djuren 60-70 cm. Arten kan leva i mer än 50 år, kräver jämn värme och hög luftfuktighet hela året och äter blad, frukt och lite animalisk föda.

Familj: Testudinidae Engelska: Yellow-Footed Tortoise Tidigare namn: *Chelonoidis denticulata; Geochelone denticulata; Testudo denticulata; Testudo tabulata* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**35-70 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**50-60 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**320 × 160 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-29 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter, frukt, växter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**96-120 mån.**
Kullstorlek	**2-7 ägg**
Inkubation	**120-190 dagar** vid 29-31 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Chelonoidis denticulatus sköts i stora drag som den nära släktingen *Chelonoidis carbonarius*, men är en mer utpräglad skogsart som kräver mer skugga, mer stabil värme och en jämnt hög luftfuktighet.

TEMPERATUR

Lufttemperaturen är 26-29 °C på dagen, och solplatsen under värmelampan är 29-32 °C, mätt på själva underlaget. Den svalare änden är 24-26 °C. På natten får temperaturen sjunka till 20-23 °C, men aldrig under 18 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten har inte mätts för arten; 70-90 % är lånat från *C. carbonarius* och passar en fuktig skogsart. Substratet ska vara jämnt fuktigt utan att stå i vatten.

LJUS OCH UVB

C. denticulatus är dagaktiv, men en skuggälskande skogsart som inte solar sig i skarpt ljus som ökenarter. UVB behövs ändå: mät UV-indexet 2,0-3,0 på solplatsen (Ferguson-zon 2).

UTFODRING

C. denticulatus är allätare. I naturen äter den blad, gräs, blommor, nedfallna frukter, svampar, as och långsamma smådjur. Frukt utgör något mer av kosten än hos *C. carbonarius*, men basen är fortfarande blad.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är lugn och nyfiken, men ofta något mer tillbakadragen än *C. carbonarius*, och den håller sig helst nära skydd. Många djur blir dock förtroendefulla och kommer fram när det finns mat.

NATURLIG UTBREDNING

Venezuela, Guyana, Surinam, Franska Guyana, Brasilien, Ecuador, Colombia, Peru, Bolivia och Trinidad och Tobago.