herpy

SKÖLDPADDOR

Sternotherus odoratus

Sternotherus odoratus är en liten, nästan helt vattenlevande sköldpadda från östra Nordamerika. Sköldpansaret blir bara 8-13 cm, men djuret kan bli många decennier gammalt. Arten är mest aktiv i skymningen och på natten, simmar dåligt och kräver ett filtrerat kar med förhållandevis lågt vatten, en varm lampa och UVB. När den känner sig hotad avger den en illaluktande vätska.

Familj: Kinosternidae Engelska: Common Musk Turtle Tidigare namn: *Kinosternon odoratum* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**8-13 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**20-50 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Akvatisk**
Biotop	**Våtmark**
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 50 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
Vatten	**Akvaterrarium** djup 15-25 cm
Vattentemperatur	**22-26 °C**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter, färdigfoder, växter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**48-120 mån.**
Kullstorlek	**1-6 ägg**
Kullar per år	**1-4**
Inkubation	**60-86 dagar** vid 25-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Håll djuret i ett akvarium eller ett lågt kar, inte i ett vanligt terrarium. Det ska finnas minst ca 15 liter vatten per cm sköldlängd, så ett vuxet djur på 10-13 cm ska ha 150-195 liter vatten.
TEMPERATUR	Vattnet ska vara 22-26 °C, och en vattenvärmare är normalt nödvändig. Undvik värmekablar eller värmemattor under karet, eftersom djuret går längs bottnen och kan bränna sig.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Sköldpaddans fuktighet är själva vattnet, så luftens relativa fuktighet är inte avgörande och inte närmare dokumenterad för arten; 50-80 % i rummet är mer än nog.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattnet är djurets uppehållsplats. Vattendjupet är 15-25 cm för vuxna djur och lägre för ungar, med grundare partier där djuret kan vila.
LJUS OCH UVB	UVB är nödvändigt för att djuret ska kunna bilda D3-vitamin och ta upp kalk. Även om djuret inte alltid kommer upp ur vattnet ska det finnas en solplats med lampa, så att det kan välja.
UTFODRING	*Sternotherus odoratus* är allätare, men övervägande köttätande.
BETEENDE OCH HANTERING	*Sternotherus odoratus* är skygg och går mest längs bottnen. Den är inget djur att ta upp: den kan bita med sin långa, rörliga hals och avge en illaluktande vätska.
NATURLIG UTBREDNING	USA och Kanada.