herpy

SKÖLDPADDOR

Terrapene carolina

Terrapene carolina är en liten, högvälvd och landlevande kärrsköldpadda från östra Nordamerika. Bukskölden har ett gångjärn, så att djuret kan stänga in sig helt i pansaret. Arten är dagaktiv, allätare och mycket långlivad, men den kräver fuktighet, en stor inhägnad, lugn skötsel och oftast en noggrant styrd vintervila.

Familj: Emydidae Engelska: Common Box Turtle Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**11-20 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**40-50 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Våtmark och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**160 × 80 × 40 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**21-24 °C**
Värmeplats	**29-31 °C**
Temperatur, natt	**10-20 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-5 cm
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter, frukt, färdigfoder, växter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**3-8 ägg**
Inkubation	**50-90 dagar** vid 26-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Terrapene carolina trivs bäst i en stor, säker inhägnad utomhus, och en stor inhägnad är alltid bättre än en liten. Välj en solig, vindskyddad plats med väldränerad jord, morgonsol och skugga hela dagen.

TEMPERATUR

Inomhus ska det finnas en solplats på 29-31 °C och en sval zon på 21-24 °C. Använd 50 W halogenspotlampor, en till en ung sköldpadda och minst två till en vuxen, och mät yttemperaturen på soldäcket med en digital sond.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

T. carolina kommer från fuktiga livsmiljöer och trivs vid en genomsnittlig luftfuktighet på 60-80 %, som aldrig får falla under ca 50 %.

LJUS OCH UVB

T. carolina är dagaktiv och behöver kraftigt ljus och UVB för att bilda D3-vitamin. Använd ett T5 HO UVB-rör på ca 6 % över solplatsen, så att det överlappar värmelamporna.

UTFODRING

T. carolina är allätare. De första 5-6 åren är unga djur övervägande köttätare, medan vuxna äter mer växtföda.

BETEENDE OCH HANTERING

T. carolina är skygg och dåligt lämpad att tas upp. Många djur lär sig dock känna igen sin skötare, tar mat ur fingrarna och njuter av en mild sköldmassage.

NATURLIG UTBREDNING

USA, Mexiko och Kanada.