herpy

SKINKAR

Italian Three-toed Skink

Chalcides chalcides

Chalcides chalcides är en smal, nästan ormliknande skink från Italien och Nordafrika med små ben, tre tår på varje fot och en svans som är minst lika lång som kroppen. Den lever på solbelysta ängar med tät, låg vegetation, gräver ner sig och föder levande ungar. Det finns bara lite kunskap om skötseln, så vägledningen bygger på arten i naturen och på släktingen *Chalcides ocellatus*.

Familj: Scincidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**25-40 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**9-20 g**
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 40 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Värmeplats	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**15-20 °C**
Luftfuktighet	**40-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Vintervila	**8-12 °C** 8-12 veckor
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Kullstorlek	**4-9 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**80-100 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Chalcides chalcides*. Artens levnadsmiljö är känd: fuktiga, solbelysta ängar med tät, låg vegetation och ett medelhavsklimat med mild vinter och varm, torr sommar.
TEMPERATUR	Arten är dagaktiv och solar sig. Temperaturerna är inte dokumenterade för fångenskap, och siffrorna här är uppskattade utifrån klimatet i Italien och utifrån *Chalcides ocellatus*.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Arten lever på fuktiga ängar, men inte i vatten. Luftfuktigheten ska vara måttlig, 40-70 %, och bottensubstratet ska vara lätt fuktigt på djupet och torrt i ytan.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och solar sig, så den behöver kraftigt ljus och UVB.
UTFODRING	I naturen äter *Chalcides chalcides* nästan uteslutande leddjur på marken: spindlar är det vanligaste bytet (över 40 %), och gråsuggor, skalbaggslarver och halvvingar som skinnbaggar och cikador följer efter.
BETEENDE OCH HANTERING	*Chalcides chalcides* är skygg och lever dolt. I naturen håller den sig i tät växtlighet och gräver ner sig, och i terrariet syns den mest när den solar sig eller jagar.
NATURLIG UTBREDNING	Italien, Algeriet, Tunisien och Libyen.