herpy

SKINKAR

## Pink-Tongued Lizard

# *Cyclodomorphus gerrardii*

*Cyclodomorphus gerrardii* är en smal, lugn skink från östra Australien med rosa tunga, mörka tvärband och en lång, svagt gripande svans. Arten blir 40-45 cm lång, lever i fuktig skog, är mest aktiv i skymningen och på natten och lever i naturen nästan bara av sniglar. Den föder levande ungar, ofta många i varje kull, och vuxna djur är mycket foglig.

Familj: Scincidae  Tidigare namn: *Hemisphaeriodon gerrardii; Tiliqua gerrardii; Hinulia gerrardii*

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **40-45 cm**<br>total längd inkl. svans |
| Livslängd | **15-20 år** |
| Aktiv | **I skymningen och på natten** |
| Levnadssätt | **Trädlevande och marklevande** |
| Biotop | **Regnskog och tempererad skog och äng** |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **120 × 60 × 60 cm**<br>L × B × H för 1 vuxet djur |
| Temperatur, dag | **20-30 °C** |
| Värmeplats | **33-36 °C** |
| Temperatur, natt | **18-22 °C** |
| Luftfuktighet | **60-80 %** |
| Vatten | **Vattenskål** |
| UVB | **Rekommenderas**<br>Fergusonzon 2 |
| Vintervila | **16-22 °C**<br>8-12 veckor |
| Föda | **Insekter, frukt, färdigfoder, ryggradsdjur och maskar/sniglar** |
| Hålls | **Ensamma** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Levandefödande** |
| Könsmogen | **22-36 mån.** |
| Kullstorlek | **10-30 ungar** |
| Dräktighet | **90-120 dagar** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ej listad** |
| EU-bilaga | **Ej listad** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**

Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd). Arten gräver, men klättrar också lite i sneda grenar och korkbark, så en lätt klätterstruktur är ett plus.

**TEMPERATUR**

Lufttemperaturen ska vara 25-30 °C på dagen, med en sval ände på 20-25 °C. Solplatsens yta ska vara 33-36 °C. Mät yttemperaturen med en infraröd termometer och lufttemperaturen i båda ändarna.

**LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN**

Arten kommer från fuktig skog, och en luftfuktighet på 60-80 % är lämplig. Terrariet måste vara väl ventilerat. Håll botten lätt fuktig, men aldrig blöt, och spraya terrariet lätt en gång om dagen.

**LJUS OCH UVB**

Djuret är mest aktivt i skymningen och på natten och lever på skogsbotten, men har nytta av svagt UVB.

**UTFODRING**

I naturen lever *Cyclodomorphus gerrardii* nästan uteslutande av snäckor och nakensniglar, och de stora, platta tänderna längst bak i munnen används för att krossa snäckskal. Snäckor är därför den största utmaningen i skötseln.

**BETEENDE OCH HANTERING**

Vuxna djur hör till de lugnaste och fogligaste skinkarna. De rör sig långsamt och är lätta att lyfta. Ungar är skyggare och tömmer tarmen vid hantering, så hanteringen hålls till ett minimum tills djuret är vant vid dig.

**NATURLIG UTBREDNING**

Australien.