herpy

SKINKAR

Gidgee Skink

Egernia stokesii

En robust, social skink med taggig svans från det halvtorra Australien. *Egernia stokesii* lever i fasta familjegrupper i bergssprickor och ihåliga trädstammar, föder levande ungar och kan spärra sitt gömsle med den taggbeklädda svansen. Den kräver värme, UVB och ett terrarium med stabila bergsstrukturer.

Familj: Scincidae Tidigare namn: *Silubosaurus stokesii*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**21-28 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**100-200 g**
Livslängd	**10-25 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och klipplevande**
Biotop	**Halvöken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Värmeplats	**43-49 °C**
Temperatur, natt	**21-27 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, frukt och växter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Kullstorlek	**1-8 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**90 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Egernia stokesii lever i grupper, och terrariet måste vara tillräckligt stort för dem. Ett par eller en liten grupp på upp till tre behöver minst 120 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd).

TEMPERATUR

Terrariet ska ha en tydlig gradient. Solplatsen ska vara 43-49 °C, mätt på ytan med infraröd termometer, och den svala delen ska ligga omkring 27 °C. Dagtemperaturen i bakgrunden är 27-32 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Arten kommer från halvtorra områden, men trivs bäst med en luftfuktighet på 40-60 %. Spraya terrariet lätt på morgonen ett par gånger i veckan, och ha ett fuktigt gömsle i den svala delen.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och behöver UVB så länge ljuset är tänt. Ett T5 HO-rör i reflektor, som täcker omkring halva terrariets längd, ger Ferguson-zon 3.

UTFODRING

Egernia stokesii är allätare. I naturen äter vuxna djur mest växter: blad, blommor, frukt och frön, och växtdelen är störst på sommaren. Unga djur äter fler insekter än vuxna.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är social och lever i familjegrupper med ett par, ungar och halvvuxen avkomma från flera kullar. Den kan hållas i par eller i en liten grupp, särskilt om djuren har vuxit upp tillsammans.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.