herpy

SKINKAR

Gold Skink

Eumeces schneiderii

En kraftig, slät och snabb skink från de torra trakterna mellan Nordafrika och Centralasien. *Eumeces schneiderii* är sandfärgad till olivbrun med orangea fläckar, gräver gärna ner sig i löst sand och är en robust, långlivad terrarieart när den får sol, UVB och djupt bottensubstrat.

Familj: Scincidae Tidigare namn: *Eumeces schneideri; Novoeumeces schneideri*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-45 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Öken och halvöken**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**40-45 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, frukt och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**5-15 ägg**
Inkubation	**40-60 dagar** vid 28-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Eumeces schneiderii lever på marken och gräver, så golvytan och bottensubstratet är det viktigaste. Ett par eller en hane med två honor behöver minst 120 × 60 × 45 cm (längd × bredd × höjd).

TEMPERATUR

Terrariet ska ha en tydlig gradient. På dagen ska terrariet vara 25-30 °C, varmast nära solplatsen och svalast i motsatta änden. Under en halogenspot ska solplatsen nå 40-45 °C, mätt på ytan med en infraröd termometer.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Arten kommer från torra trakter och ska hållas torrt med en luftfuktighet på 20-40 %, i vart fall under 50 %. Det räcker att spraya lätt en gång i veckan.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och ska ha UVB hela den tid ljuset är tänt. Den hör till Ferguson-zon 3 och ska ha ett UV-index på omkring 3 på solplatsen.

UTFODRING

Eumeces schneiderii är allätare, men äter framför allt levande insekter och andra smådjur: syrsor, kackerlackor, mjölmaskar, superormar, silkesmaskar, sniglar och daggmaskar.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är nyfiken och undersöker gärna sin omgivning. Nya djur är ofta försiktiga, men med tålamod och utfodring från pincett blir de lugna. Lyft djuret underifrån och ta aldrig tag ovanifrån. Ett bett kan göra ont.

NATURLIG UTBREDNING

Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Israel, Palestinska territorierna, Cypern, Turkiet, Syrien, Libanon, Jordanien, Iran, Irak, Saudiarabien, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Ryssland, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Afghanistan och Pakistan.