herpy

SKINKAR

Western Blue-Tongued Lizard

Tiliqua occipitalis

Tiliqua occipitalis är en kraftig, markbunden skink från södra och centrala Australien med bruna tvärband över kropp och svans och den breda, blå tunga som kännetecknar släktet. Arten blir omkring 40 cm lång, är dagaktiv och allätare och ska ha ett stort terrarium med UVB och en varm solplats. Den föder levande ungar och ses sällan i fångenskap.

Familj: Scincidae Tidigare namn: *Cyclodus occipitalis; Cyclodus fasciatus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**35-45 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Halvöken och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-32 °C**
Värmeplats	**35-45 °C**
Temperatur, natt	**15-22 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, frukt, växter, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Kullstorlek	**5 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**90-120 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur ska ha ett terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd). Större är bättre. Golvytan är viktigare än höjden, eftersom djuret lever på marken.

TEMPERATUR

Ge djuret en temperaturgradient från 22-26 °C i den svala änden till 28-32 °C i den varma änden. Ytan på solplatsen ska vara 35-45 °C, och djuret ska kunna välja hur varmt det vill ligga.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Arten kommer från torra till halvtorra trakter och ska inte ha hög luftfuktighet. 30-50 % är lämpligt, mätt i den svala änden. Bottnen ska vara lätt fuktig djupare ner, men aldrig blöt.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och ska ha både UVB och kraftigt ljus. Använd ett T5-rör med UVB över nätet, och placera det så att UV-indexet på solplatsen är 3-4 (Ferguson-zon 3).

UTFODRING

Tiliqua occipitalis är allätare, och födan ska varieras så mycket som möjligt. Grönt är till exempel maskrosor, hibiskusblommor, tusenskönor, kål och riven squash, och frukt ges i mindre mängder, både mjuk och hård.

BETEENDE OCH HANTERING

Skinken är skygg de första dagarna, men vänjer sig och tål lugn hantering. Lyft den med hela kroppen understödd, så att fötterna har något att stå på, håll den aldrig med buken uppåt, och ta aldrig tag i huvudet eller svansen.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.