herpy

SKINKAR

Spiny Skink

Tribolonotus novaeguineae

Tribolonotus novaeguineae är en liten, skygg skink från låglandsregnskogen på Nya Guinea med rader av spetsiga, bakåtböjda fjäll längs ryggen. Den lever gömd i fuktigt skogsavfall, är mest aktiv i skymningen och lägger bara ett ägg åt gången. Det finns bara lite kunskap om skötseln av just denna art, och den lämpar sig bäst som utställningsdjur.

Familj: Scincidae Tidigare namn: *Zonurus novaeguineae*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**16-20 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Värmeplats	**27-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**36-48 mån.**
Kullstorlek	**1 ägg**
Kullar per år	**1-6**
Inkubation	**65-85 dagar** vid 23-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Bilaga D**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Tribolonotus novaeguineae*. Arten lever i samma sorts regnskogsmark som *Tribolonotus gracilis* från norra Nya Guinea, har samma storlek och i stort sett samma krav.

TEMPERATUR

Dagstemperaturen ska vara 24-27 °C, och ett varmt gömsle med 27-28 °C håller djuret igång, även om det inte solar sig. På natten är 22-24 °C lämpligt.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara 70-90 %, högst på natten, och bottensubstratet ska alltid vara fuktigt.

LJUS OCH UVB

Arten är aktiv i skymningen och ska inte ha en kraftig solplats, men 12 timmars dagsljus per dygn håller dygnsrytmen.

UTFODRING

Tribolonotus novaeguineae är insektsätare. Grundfodret är syrsor, kackerlackor, daggmaskar, mjölmaskar och sidenspinnarlarver, och vaxmottslarver och supermaskar ges i mindre mängder.

BETEENDE OCH HANTERING

Tribolonotus novaeguineae är ett djur att titta på och inte för hantering. När den blir gripen kan den ge ifrån sig läten, spela död, försöka fly eller släppa svansen, och det stressar den.

NATURLIG UTBREDNING

Indonesien och Papua Nya Guinea.