herpy

SKINKAR

Giant Spiny Skink

Tribolonotus ponceleti

Tribolonotus ponceleti är en sällsynt, gömd skink från öarna i Salomonöarnas ögrupp och den största arten i sitt släkte. Den har kölade, taggiga fjäll och ett kantigt, pansrat huvud, lever i skogsbotten och gräver ner sig, och den kan ge ifrån sig läten. Skötseln bygger på klimatet och på de nära släktingarna *Tribolonotus gracilis* och *Tribolonotus novaeguineae*.

Familj: Scincidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**11-13 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**75 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Värmeplats	**27-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1 ägg**
Inkubation	**65-85 dagar** vid 23-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Kunskapsbrist (DD)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns mycket lite kunskap om skötseln av *Tribolonotus ponceleti*. Klimatet i utbredningsområdet är varmt och fuktigt hela året, och arten lever i skogsbottnens löv.
TEMPERATUR	Håll terrariet på 24-27 °C i den svala änden och 27-28 °C i ett varmt gömsle, och låt temperaturen sjunka till 22-24 °C på natten. Skinken är aktiv i skymningen och på natten och solar sig knappast, utan värmer sig i gömslen.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara 70-80 % på dagen och högre på natten, gärna 80-90 %, och bottensubstratet ska alltid vara fuktigt. Arten tål sannolikt uttorkning mycket dåligt, liksom de nära släktingarna.
LJUS OCH UVB	Djuret är aktivt i skymningen och på natten, och behovet av UVB är inte dokumenterat. Hos de nära släktingarna kan djuren klara sig utan UVB när fodret får kalk och D3-vitamin, men ett svagt UVB-ljus rekommenderas.
UTFODRING	Arten äter leddjur i naturen. Grundfodret kan vara syrsor, kackerlackor, mjölmaskar, sidenspinnarlarver, larver av soldatflugan, daggmaskar och snäckor. Variation är viktigt, och daggmaskar får oftast fram ett gömt djur.
BETEENDE OCH HANTERING	*Tribolonotus ponceleti* är ett djur att titta på och inte för hantering. Skinkar i släktet spelar död, försöker fly, släpper svansen eller ger ifrån sig läten när de blir gripna, och det stressar dem.
NATURLIG UTBREDNING	Salomonöarna och Papua Nya Guinea.