herpy

SKINKAR

False Poncelet's Helmet Skink

Tribolonotus pseudoponceleti

Tribolonotus pseudoponceleti är en liten, undangömd skink från Bougainville och Buka i norra delen av Salomonöarna. Den har kölade, grova fjäll och ett triangulärt huvud och lever under ruttna stammar, oftast i par. Skötseln är nästan inte beskriven och bygger därför på artens levnadssätt i naturen och på de nära släktingarna *Tribolonotus gracilis* och *Tribolonotus novaeguineae*.

Familj: Scincidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-7 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 30 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Värmeplats	**27-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1 ägg**
Inkubation	**65-85 dagar** vid 23-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Skötseln av *Tribolonotus pseudoponceleti* är nästan inte beskriven. Arten lever i ett varmt och fuktigt klimat och gömmer sig under ruttna stammar.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 24-27 °C i den svala änden och 27-28 °C i ett varmt gömställe, och på natten 22-24 °C. Arten visar sig inte i det öppna och solar sig inte, utan värmer sig under stammar och bark.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara 70-80 % på dagen och 80-90 % på natten, och bottensubstratet ska alltid vara fuktigt, men inte dyngsurt; arten föredrar fuktiga, men inte vattenmättade platser.
LJUS OCH UVB	Behovet av UVB är inte dokumenterat. De nära släktingarna klarar sig utan UVB när fodret får kalk och D3-vitamin, men en svag UVB-belysning rekommenderas.
UTFODRING	Arten äter små leddjur, i fångenskap också termiter. Grundfodret kan vara små syrsor, kackerlackor, mjölmaskar, silkesmaskar, larver av soldatflugan, daggmaskar och små sniglar. Variation är viktigt.
BETEENDE OCH HANTERING	*Tribolonotus pseudoponceleti* är ett djur att titta på och inte att hantera. Blir den avtäckt trycker den sig platt mot marken och blir liggande eller kryper långsamt iväg; den försöker sällan fly.
NATURLIG UTBREDNING	Papua Nya Guinea.