herpy

SKINKAR

Cyclodomorphus gerrardii

Cyclodomorphus gerrardii är en smal, lugn skink från östra Australien med rosa tunga, mörka tvärband och en lång, svagt gripande svans. Arten blir 40-45 cm lång, lever i fuktig skog, är mest aktiv i skymningen och på natten och lever i naturen nästan bara av sniglar. Den föder levande ungar, ofta många i varje kull, och vuxna djur är mycket foglig.

Familj: Scincidae Engelska: Pink-Tongued Lizard Tidigare namn: *Hemisphaeriodon gerrardii; Tiliqua gerrardii; Hinulia gerrardii* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**40-45 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Regnskog och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**20-30 °C**
Värmeplats	**33-36 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Vintervila	**16-22 °C** 8-12 veckor
Föda	**Insekter, frukt, färdigfoder, ryggradsdjur och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**22-36 mån.**
Kullstorlek	**10-30 ungar**
Dräktighet	**90-120 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd). Arten gräver, men klättrar också lite i sneda grenar och korkbark, så en lätt klätterstruktur är ett plus.

TEMPERATUR

Lufttemperaturen ska vara 25-30 °C på dagen, med en sval ände på 20-25 °C. Solplatsens yta ska vara 33-36 °C. Mät yttemperaturen med en infraröd termometer och lufttemperaturen i båda ändarna.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Arten kommer från fuktig skog, och en luftfuktighet på 60-80 % är lämplig. Uppgifterna varierar från 50-70 % till 70-90 %, och vid den höga änden ska terrariet vara väl ventilerat.

LJUS OCH UVB

Djuret är mest aktivt i skymningen och på natten och lever på skogsbotten, men har nytta av svag UVB.

UTFODRING

I naturen lever *Cyclodomorphus gerrardii* nästan uteslutande av sniglar och nakensniglar, och de stora, platta tänderna längst bak i munnen används för att krossa snigelskal. Sniglar är därför den största utmaningen i skötseln.

BETEENDE OCH HANTERING

Vuxna djur hör till de lugnaste och fogligaste skinkarna. De rör sig långsamt och är lätta att lyfta. Ungar är skyggare och tömmer tarmen vid hantering, så hanteringen hålls till ett minimum tills djuret är vant vid dig.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.