herpy

SKINKAR

Egernia cunninghami

En stor, dagaktiv och mycket social skink med taggig svans från det tempererade sydöstra Australien. *Egernia cunninghami* lever i familjegrupper i bergssprickor, föder levande ungar och vilar i de kalla månaderna. Den kräver ett stort, solbelyst terrarium med stabila bergsstrukturer och UVB.

Familj: Scincidae Engelska: Cunningham's Skink Tidigare namn: *Tiliqua cunninghami* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-40 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**200-350 g**
Livslängd	**20-27 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Klipplevande**
Biotop	**Klippterräng och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Värmeplats	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**12-18 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, frukt, växter och maskar/sniglar**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**60 mån.**
Kullstorlek	**1-8 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**90 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Egernia cunninghami är en stor art och kräver ett rymligt terrarium. Ett par behöver minst 120 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd); 120 × 40 × 40 cm är den absoluta nedre gränsen och ger bara lite utrymme för en gradient.

TEMPERATUR

Terrariet ska ha en tydlig gradient: 31-35 °C i den varma delen och omkring 25 °C i den svala.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Egernia cunninghami kommer från tempererade bergsskogar, och en luftfuktighet på 40-60 % passar. Spraya terrariet lätt ett par gånger i veckan, och ha ett fuktigt gömsle i den svala delen så att djuret själv kan välja.

LJUS OCH UVB

Egernia cunninghami är dagaktiv, solar mycket och behöver UVB så länge ljuset är tänt. Ett UVB-rör på 5-6 % i reflektor över solplatsen, som täcker ungefär halva terrariets längd, ger Fergusonzon 3.

UTFODRING

Egernia cunninghami är allätare, men vuxna djur är övervägande växtätare: i naturen består över 90 % av deras föda av växtdelar. Ungdjur äter betydligt fler leddjur.

BETEENDE OCH HANTERING

Egernia cunninghami är ett av de mest sociala kräldjuren: den lever i långvariga familjegrupper.

NATURLIG UTBREDNING

Australien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/skinker/egernia-cunninghami