herpy

SKINKAR

Lamprolepis smaragdina

Lamprolepis smaragdina är en smal, dagaktiv skink som lever i träden på öarna i Sydostasien och västra Stilla havet. Den är oftast smaragdgrön med bruna, vitprickiga bakben och tillbringar största delen av tiden på stammar och grenar. I terrariet behöver den höjd, värme, kraftig UVB och hög luftfuktighet, och den lämpar sig bäst som utställningsdjur.

Familj: Scincidae Engelska: Emerald Skink Tidigare namn: *Dasia smaragdina; Lygosoma smaragdinum* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-25 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**7-12 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**33-36 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**70-100 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter, frukt och färdigfoder**
Hålls	**Ensamma eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**9-13 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**69-100 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett enstaka vuxet *Lamprolepis smaragdina* behöver ett terrarium på minst 60 × 45 × 90 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre, särskilt på höjden. Arten är trädlevande, så höjden är viktigare än golvytan.

TEMPERATUR

Solplatsen för *Lamprolepis smaragdina* ska vara omkring 35 °C, mätt på själva grenen med en digital givare. Den svala sidan ska vara 24-29 °C, och på natten ska temperaturen vara 20-25 °C. Värmekällan stängs av på natten.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten i terrariet för *Lamprolepis smaragdina* ska vara omkring 70 % på dagen och stiga mot 100 % på natten. Spraya terrariet morgon och kväll, helst när det är mörkt, och gärna lätt igen på eftermiddagen.

LJUS OCH UVB

Lamprolepis smaragdina är dagaktiv och lever i solbelysta träd, så arten behöver kraftig UVB och starkt ljus.

UTFODRING

Lamprolepis smaragdina är i första hand insektsätare, men tar lite frukt och blommor. Grundfodret kan vara syrsor, kackerlackor (till exempel *Blaptica dubia*), gräshoppor och andra varierade insekter.

BETEENDE OCH HANTERING

Lamprolepis smaragdina är snabb och skygg och bättre som utställningsdjur än som djur för hantering. Ett nytt djur ska få minst två veckors ro. Äter det inte efter den tiden bör det till veterinär innan det hanteras.

NATURLIG UTBREDNING

Filippinerna, Indonesien, Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Mikronesien, Marshallöarna, Palau och Östtimor.