herpy

SKINKAR

Tiliqua rugosa

En långsam, tungt pansrad australisk skink som liknar ett grankott med en kort, bred svans. *Tiliqua rugosa* har en koboltblå tunga som den visar upp vid hot, lever mest av växter och bildar par som håller ihop år efter år. Den kräver solplats, UVB och torra förhållanden.

Familj: Scincidae Engelska: Bobtail Tidigare namn: *Trachydosaurus rugosus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-45 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**600-900 g**
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Halvöken och savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**15-29 °C**
Värmeplats	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**10-20 °C**
Luftfuktighet	**20-40 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, frukt, växter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Kullstorlek	**1-4 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**140-170 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Arten klättrar inte, så golvytan är det viktigaste. Ett par ska ha minst 120 × 60 × 45 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre. Mindre terrarier på 90-100 × 50-60 cm räcker bara för ett djur.

TEMPERATUR
Terrariet ska ha en tydlig gradient. Den varma änden ska vara 27-29 °C, och under en spotlampa ska solplatsen nå 35-40 °C flera timmar per dag. Uppgifterna för den svala änden varierar från omkring 15 °C till 21 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Arten kommer från torra trakter och ska ha en luftfuktighet på 20-40 %. Håll bottnen torr, och låt inte vatten stå. Erbjud färskt vatten i en mycket låg skål som inte kan välta och som djuret lätt kan ta sig upp ur.

LJUS OCH UVB
Arten är dagaktiv och ska ha ett UVB-rör tänt 8-12 timmar per dag. Röret ska mätas regelbundet eller bytas minst varje halvår, eftersom UVB-strålningen avtar. Ferguson-zon 3 är en uppskattning för en art som solar i öppen terräng.

UTFODRING
Tiliqua rugosa är allätare med tyngdpunkt på växter. Vuxna djur ska ha 70-80 % växtkost och bara 20-30 % animalisk föda.

BETEENDE OCH HANTERING
Arten är lugn och vänjer sig vid försiktig hantering. Nya djur kan vara skygga, och en del går tillbaka till fräsande och gapande efter några dagar utan kontakt. Håll aldrig djuret på rygg, och ge alltid fötterna något att stå på.

NATURLIG UTBREDNING
Australien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/skinker/tiliqua-rugosa