herpy

SKINKAR

Trachylepis quinquetaeniata

Trachylepis quinquetaeniata är en aktiv, dagaktiv skink från norra och centrala Afrika med glänsande, metalliska fjäll, ljusa längsgående ränder och en svans som hos unga djur och honor lyser elektriskt blå. Den solar sig på sten och lever av insekter. Den är snabb och skygg, så den lämpar sig bäst som utställningsdjur, inte för hantering.

Familj: Scincidae Engelska: African Five-lined Skink Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**20-25 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**4-5 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Klipplevande och marklevande**
Biotop	**Halvöken, savann och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**12-15 mån.**
Kullstorlek	**3-10 ägg**
Kullar per år	**1-2**
Inkubation	**60-62 dagar** vid 27-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett enskilt djur ska ha ett terrarium på minst 90 × 45 × 45 cm. Arten är snabb och mycket aktiv och använder all plats den får, så större är bättre. En avelsgrupp med en hane och två till tre honor kräver minst 120 × 60 × 60 cm.

TEMPERATUR
Trachylepis quinquetaeniata är en solälskare. Håll 24-29 °C i den svala delen av terrariet och 32-35 °C på själva solplatsen, mätt på ytan med en digital givare eller en IR-termometer.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Arten kräver en måttlig luftfuktighet på 60-80 %, lägre på dagen och högre på natten.

LJUS OCH UVB
Arten är dagaktiv och behöver starkt, klart ljus och UVB. Arten solar sig i öppen, stenig terräng och hör efter levnadssätt till Ferguson-zon 3.

UTFODRING
Arten är insektsätare.

BETEENDE OCH HANTERING
Trachylepis quinquetaeniata är snabb, nervös och vaksam och är ett djur att titta på. Den flyr, tappar svansen och stressas av upprepad hantering.

NATURLIG UTBREDNING
Benin, Burkina Faso, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Tchad, Kongo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypten, Eritrea, Etiopien, Ghana, Guinea, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sydsudan, Sudan, Tanzania, Togo och Uganda.