herpy

SKINKAR

Tribolonotus blanchardi

Tribolonotus blanchardi är en mycket liten skink från skogarna på Salomonöarna och Bougainville. Den mäter bara 3-4 cm från nos till kloak, lever gömd i det fuktiga lövet längs små skogsbäckar och lägger ett ägg åt gången. Det finns bara lite kunskap om arten och dess skötsel.

Familj: Scincidae Engelska: Blanchard's Helmet Skink Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 30 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-26 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**80-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1 ägg**
Inkubation	**65-85 dagar** vid 23-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Tribolonotus blanchardi*.
TEMPERATUR	*Tribolonotus blanchardi* använder inte solplatser. Håll 24-26 °C på dagen utan solplats och 20-22 °C på natten. Natten får gärna vara något svalare än för *Tribolonotus gracilis*, eftersom arten också lever i bergsskog.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	*Tribolonotus blanchardi* tål uttorkning mycket dåligt. Luftfuktigheten ska vara hög, 80-90 %, och bottensubstratet ska alltid vara fuktigt. Spraya morgon och kväll, eller använd ett automatiskt regnsystem.
LJUS OCH UVB	*Tribolonotus blanchardi* lever gömd i lövet i skuggig skog.
UTFODRING	*Tribolonotus blanchardi* äter insekter. Ge små bytesdjur: små syrsor, bananflugor, hoppstjärtar, små kackerlackor och små daggmaskar.
BETEENDE OCH HANTERING	*Tribolonotus blanchardi* är skygg och tillbringar större delen av tiden gömd. Den är ett djur att titta på och inte för hantering. Ge ett nytt djur minst två veckors lugn.
NATURLIG UTBREDNING	Salomonöarna och Papua Nya Guinea.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/skinker/tribolonotus-blanchardi