herpy

SKINKAR

Tribolonotus gracilis

Tribolonotus gracilis är en skygg, skymningsaktiv skink från regnskogen på norra Nya Guinea med en rödorange ring runt ögonen och rader av spetsiga, bakåtböjda fjäll längs ryggen som ger den ett pansrat, nästan drakliknande utseende. Den lever gömd i fuktigt skogsavfall, kan ge ifrån sig läten och lägger bara ett ägg åt gången. Den lämpar sig bäst som utställningsdjur, inte för hantering.

Familj: Scincidae Engelska: Red-Eyed Bush Crocodile Skink Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**16-20 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Värmeplats	**27-28 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**70-90 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och maskar/sniglar**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**36-48 mån.**
Kullstorlek	**1 ägg**
Kullar per år	**1-6**
Inkubation	**65-85 dagar** vid 23-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Bilaga D**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett enskilt djur ska ha ett terrarium på minst 60 × 45 × 45 cm, och större är bättre. Ett par ska ha minst 0,3 m² botten, till exempel 90 × 45 cm.

TEMPERATUR

Tribolonotus gracilis är tropisk, men solar sig inte i naturen. Håll terrariet på 24-26 °C i den svala änden och 27-28 °C i ett varmt gömsle, och låt temperaturen sjunka till 22-24 °C på natten.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Arten tål uttorkning mycket dåligt. Luftfuktigheten ska vara 70-80 % på dagen och högre på natten, gärna omkring 90 %, och bottensubstratet ska alltid vara fuktigt.

LJUS OCH UVB

Arten är aktiv i skymningen och på natten, och uppgifterna om UVB går isär. Djuret kan klara sig och föröka sig utan UVB när fodret får kalk och D3-vitamin, men ett svagt UVB-ljus ger de bästa resultaten och rekommenderas.

UTFODRING

Arten är insektsätare.

BETEENDE OCH HANTERING

Tribolonotus gracilis är ett djur att titta på och inte för hantering. När den blir gripen skriker den, spelar död, försöker fly eller släpper svansen, och det stressar den.

NATURLIG UTBREDNING

Papua Nya Guinea och Indonesien.